ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

Морфологические изменения щитовидной железы у потомства крыс с материнским тиреотоксикозом

С.М. Ахмедова, К.С. Комилов, Ж.С. Туробов

Ташкентская медицинская академия

Аннотация: В данной статье изучены морфологические изменения щитовидной железы у потомства самок с экспериментальным тиреотоксикозом. Эксперимент проводился на лабораторных крысах, у которых тиреотоксикоз вызывался введением тироксина. У потомства выявлено увеличение объёма щитовидной железы, гиперплазия и изменения фолликулярных клеток. Эти изменения способствовали развитию субклинического гипотиреоза. Полученные результаты подтверждают необходимость тщательного контроля беременности у самок с тиреотоксикозом и регулярного мониторинга функции щитовидной железы у их потомства.
Ключевые слова: тиреотоксикоз, щитовидная железа, морфологические изменения, экспериментальное исследование, гиперплазия, субклинический гипотиреоз, тиреоидные гормоны, потомство, лабораторные крысы.

Тиреотоксикоз – это патологическое состояние, связанное с гиперфункцией щитовидной железы, при котором наблюдается избыточная продукция тиреоидных гормонов. Во время беременности это состояние может негативно сказываться не только на здоровье матери, но и на развитии плода. Тиреоидные гормоны играют ключевую роль в формировании нервной системы, тканей и органов плода. Научные исследования показывают, что тиреотоксикоз во время беременности может вызывать серьёзные изменения, в частности морфологические аномалии щитовидной железы у потомства. В экспериментальной медицине тиреотоксикоз моделируется у лабораторных животных для изучения его влияния на организм потомства.

Материалы и методы: В эксперименте использовались белые лабораторные крысы (Rattus norvegicus) в возрасте 3-4 месяцев и массой 180-220 г. Животные содержались в виварии при температуре 22-24°C и режиме освещения 12/12 часов (день/ночь). Беременные крысы были разделены на две группы: экспериментальную (с тиреотоксикозом) и контрольную (здоровые особи). Экспериментальный тиреотоксикоз индуцировался введением «Мерказолила» (150 мкг/кг) в течение 14 дней. Контрольная группа получала физиологический раствор. Морфологические изменения щитовидной железы изучались на 7-й и 14-й день после рождения. Гистологический анализ проводился на образцах, окрашенных гематоксилином и эозином. Также был выполнен анализ уровней тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4) методом иммуноферментного анализа.

Результаты: У потомства самок с тиреотоксикозом уровень ТТГ был на 35% выше ($p < 0,05$), а уровень свободного Т4 ниже по сравнению с контрольной группой, что указывает на развитие субклинического гипотиреоза. На 14-й день жизни уровень ТТГ у экспериментальных крыс составил 3,1 ± 0,4 мМЕ/л, тогда

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

как у контрольных – 1,9 ± 0,3 мМЕ/л. У новорождённых крыс из экспериментальной группы отмечено значительное увеличение щитовидной железы: на 7-й день её средний объём составил 1,25 ± 0,13 см³ против 0,85 ± 0,09 см³ в контрольной группе ($p < 0,01$). К 14-му дню объём железы увеличился до 1,38 ± 0,15 см³, тогда как в контрольной группе он составлял 0,92 ± 0,08 см³. Гистологический анализ показал гиперплазию фолликулярных клеток и нарушения тканевой структуры. (Рисунок 1).





Рисунок 1. **Гиперплазия фолликулярных клеток щитовидной железы.**

Окрашивание гематоксилин-эозином. Увеличение 200×.

Обсуждение: Увеличение количества фолликулов, нарушение их структуры и уменьшение содержания коллоида указывают на повышенную функциональную активность железы. В некоторых случаях наблюдались воспалительные и дистрофические изменения тканей. Эти изменения могут быть связаны с трансплацентарной передачей тиреоидных гормонов и аутоантител к рецепторам ТТГ. Гистологические данные также подтверждают наличие воспалительных процессов, возникающих как компенсаторная реакция на гиперфункцию железы.

Рисунок 2.
Признаки воспаления и дистрофии.

Окрашивание гематоксилин-эозином. Увеличение 200×.



ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

Заключение: У потомства самок с тиреотоксикозом наблюдаются выраженные морфологические изменения щитовидной железы, включая увеличение её объёма, гиперплазию фолликулярных клеток и воспалительные процессы. Эти изменения могут приводить к гормональным нарушениям, включая субклинический гипотиреоз, который проявляется в постнатальном периоде. Полученные результаты подчёркивают необходимость тщательного контроля состояния щитовидной железы у беременных самок с тиреотоксикозом, а также регулярного мониторинга функции щитовидной железы у их потомства для предотвращения возможных осложнений.

Литература:

1. Arzhanova O. N. Заболевание щитовидной железы и беременность // Проблемы эндокринологии в акушерстве и гинекологии: материалы 2-го съезда Российской ассоциации акушеров-гинекологов / ред. В. Н. Серова. — М., 1997. — С. 127–128.
2. Kashirova T. V. Болезнь Грейвса и репродуктивная функция женщины // Клиническая экспериментальная тиреоидология. — 2007. — Т. 3, № 2.— С. 19–25.
3. Shidlovskaya N. V. Врожденная патология у новорожденных, родившихся у матерей с диффузным токсическим зобом // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2008. — № 6. — С. 40–44.
4. Dedov I. I., Mel’nichenko G. A., Fadeev V. V. Эндокринология. — М.: Медицина, 2000. — С. 172–188.
5. Melnichenko G. A. et al. Заболевания щитовидной железы во время беременности: диагностика, лечение, профилактика: пособие для врачей. — М.: МедЭкспертПресс, 2003.— 48 с.
6. Bartalena L., Pinchera A., Marcocci L. Management of Graves’ ophthalmopathy: reality and perspectives // Endocr. Rev. — 2000. — Vol. 21. — P. 168-199.
7. Luton D. et al. Management of Graves’ Disease during pregnancy: the key role of fetal thyroid gland monitoring // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2005. — Vol. 90, № 11. — P. 6093–6098.