ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

УДК 615.8 9

NaCl обеспечивает динамическую авторегуляцию почечного обмена у крысы

Хикматова Мадина Фуркатовна

Бухарс кий государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, Узбекистан, г.Бухара , ул.Гиждуванская.23. Тел:+998(65) 223-00-50 e- mail : buhme @ mail . RU

Резюме. Исследования показывают, что диета с небольшим содержанием хлорида натрия (NaCl) может вызвать негативное воздействие на динамическую авторегуляцию поточного потока у крыс. Динамическая авторегуляция почечного обмена - это критический механизм, который помогает почкам поддерживать стабильный поворот в них при изменениях артериального давления. Этот механизм включает сужение или расширение артериальных сосудов для поддержания кровотока и фильтрации. Диета, богатая натрием и хлором, может нарушить этот процесс авторегуляции . Высокий уровень натрия в расчете приводит к увеличению объема циркулирующей крови и артериального давления. В ответ на это почечные артериолы должны быстро реагировать, сужаясь, чтобы обеспечить нормальный поток и фильтрацию. Однако на фоне современного потребления большого количества натрия эти артериолы могут потерять возможность эффективному сокращению или расширению, что обеспечивает динамическую авторегуляцию .

Ключевые слова: натрий хлорид (NaCl), авторегуляция , соли, почки, давление, натрий, калий, фильтр.

Введение. Как известно, в почках происходят процессы ультрафильтрации и образования первичной мочи с последующей реабсорбцией, концентрацией и секрецией, в результате чего образуется вторичная моча. Суточный диурез у взрослого человека в норме составляет примерно 1,5-2,0 литра. Относительная плотность мочи варьирует от 1,002 до 1,035. Суточный диурез менее 400 мл обычно называют олигурией, а менее 100 мл — анурией. В условиях нормального диуреза в течение суток с мочой выводится до 340 ммоль натрия, 91 ммоль калия, 5,0 ммоль кальция и 0,41 ммоль магния. Содержание неорганического фосфора в суточной моче колеблется от 19,37 до 31,3 ммоль , а хлоридов - от 99,0 до 297 ммоль . Процессу ультрафильтрации способствует эффективное фильтрационное давление в капиллярах клубочков, рассчитываемое по формуле Рэф = Pgd - (Pcol + Pic), и составляет в среднем от 15 до 25 мм рт. ст. (Рэф - эффективное фильтрационное давление; Pgd - гидродинамическое давление в почках). клубочковые сосуды Pcol – коллоидно-осмотическое внутрисосудистое давление; Pic – внутрикапсулярное давление); Базальная мембрана сосудов клубочка почек и капсула Боумена, состоящая из механических и электрохимических полианионных барьеров, обеспечивает ежедневную фильтрацию около 160–180 литров первичной мочи, содержащей низкомолекулярные белки (около 3 г), аминокислоты, а также глюкозу. , мочевая кислота, мочевина, креатинин, натрий, кальций, калий, хлорид, фосфат-анионы, сера и другие. Процесс фильтрации регулируется предсердным натрийуретическим фактором, а также уровнем адреналина и норадреналина в крови, которые влияют на тонус афферентных и эфферентных

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

клубочковых сосудов и почечных артерий. В проксимальных канальцах происходят облигатные, гормонально нерегулируемые (вазопрессин, минералоглюкокортикоиды) процессы реабсорбции, осуществляемые специализированными ферментными системами, работающими автономно, независимо друг от друга. В процессе проксимальной реабсорбции, определяемой активностью ферментных ансамблей канальцевого эпителия, фильтрующийся белок, глюкоза, аминокислоты, электролиты и мочевина полностью всасываются. В то же время вслед за активно реабсорбируемыми гидрофильными компонентами первичной мочи вода всасывается пассивно. В целом около 7/8 воды реабсорбируется в проксимальных канальцах, но концентрации мочи не происходит. В петле Генле за счет ротационно-противоточной системы начинается концентрирование мочи, которое продолжается в дистальных почечных канальцах. В дистальных канальцах происходят процессы факультативной реабсорбции и секреции электролитов натрия и калия, а также ионов водорода и других компонентов мочи.

При некоторых заболеваниях у человека (сахарный диабет, хроническая болезнь почек (ХБП) необходимы дополнительные врачебные мероприятия по коррекции осмоляльности плазмы крови и поддержанию этого параметра в строго заданном диапазоне с участием системы осморегуляции . Слова дополнительные мероприятия связаны с тем, что в клинике при коррекции осмоляльности крови часто не обращают внимания на фактор, вызывающий гиперосмию ... Так, при сахарном диабете это будет глюкоза, а при хронической болезни почек - мочевина с одинаковой моляльной концентрацией . этих веществ в сыворотке крови их влияние на величину осмоляльности сыворотки крови будет одинаковым, а на клеточную осморегуляцию разным. Ранее говорилось, что осмоляльность плазмы крови является одним из наиболее строго контролируемых физико-химических показателей у человека. Причина Для установки регуляторных систем на приоритетность этого параметра является то, что объем каждой клетки зависит от осмоляльности околоклеточной жидкости организма. В условиях поддержания общего содержания осмотически активных веществ внутри клетки под плазматической мембраной в узко заданном диапазоне стабильность общей концентрации растворенных веществ в цитоплазме и в некоторых органеллах клетки зависит от осмоляльности плазмы крови. Он определит объем ячейки и количество воды в ней. Таким образом, регуляция объема клетки — клеточная волюрегуляция — зависит от трех факторов: 1) осмоляльности околоклеточной жидкости, 2) осмотической проницаемости плазматической мембраны, 3) общего содержания осмотически активных веществ внутри клетки. Что касается почек, то осмотически свободная вода играет важную роль в механизме концентрирования мочи. В почках существует механизм, который позволяет организму удерживать воду или избавляться от нее в зависимости от потребностей организма в регулировании водного баланса.

Процесс концентрирования мочи в почках происходит в осмотическом градиенте между мозговым и корковым отделами почек. Осмотически свободная вода выходит из собирательных трубочек по осмотическому градиенту, создаваемому медуллярной интерстициальной осмотической концентрацией, что позволяет организму сохранять воду при необходимости.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-4

Когда организму необходимо удерживать воду, мозговые отделы почек создают высокий осмотический градиент, что приводит к задержке осмотически свободной воды и концентрированной мочи. И наоборот, когда организму необходимо избавиться от лишней воды, мозговые области создают более низкий осмотический градиент, что способствует растворению осмотически свободной воды и образованию разбавленной мочи. Измерение этого параметра потребует разработки дополнительной методики расчета и сравнения нескольких подходов. Для количественной оценки осморегуляторной функции почек рассчитывают реабсорбцию осмотически свободной воды (Tc H20): Tc H2O = COsm – V и выведение осмотически свободной воды (CH2O) CH2O = V – COsm . Таким образом, ясно, что выделяемая моча представляет собой сумму этих величин: V = COsm + CH2O. В приведенных формулах V — скорость диуреза в мл/мин, COsm — осмоляльный клиренс, который равен отношению осмоляльности мочи (UOsm) к осмоляльности сыворотки (POsm), умноженному на диурез (V): COsm = UOsm•V / POsm . Диурез, осмолальный клиренс, реабсорбция осмотически свободной воды и скорость клубочковой фильтрации рассчитываются у человека в мл/мин на 1,73 м2 площади поверхности тела. Первое из упомянутых значений — реабсорбция осмотически свободной воды (Tc H20) наблюдается в условиях секреции вазопрессина (антидиуретического гормона). Вазопрессин, также известный как антидиуретический гормон (АДГ), играет важную роль в регулировании водного баланса и концентрации мочи в организме. Секреция вазопрессина происходит в ответ на изменения осмотического давления крови или объема циркулирующей крови. Одним из основных стимулов секреции вазопрессина является повышение осмотического давления крови. Когда концентрация осмотически активных веществ в плазме крови увеличивается (например, при обезвоживании), это действует на осмотически чувствительные рецепторы гипоталамуса, что приводит к увеличению секреции вазопрессина. Максимальное его значение у человека можно измерить на фоне секреции вазопрессина в условиях осмотического диуреза; постоянная величина при наиболее интенсивной деятельности почек составляет около 5 мл/мин на 1,73 м2 площади поверхности тела. Экскреция осмотически свободной воды (CH2O) определяется в условиях водной нагрузки в объеме 2% от массы тела (это приводит к полному подавлению эндогенной секреции аргинин-вазопрессина в кровь) и у мужчин при максимальном водном диурезе составляет 14,7 мл. /мин в день. Площадь кузова 73 м2. Уменьшение объема циркулирующей крови, например, вследствие кровопотери или длительной гипотонии, также может стимулировать секрецию вазопрессина. Это происходит через рецепторы сосудистой системы, которые реагируют на изменения объема и давления крови. Стрессовые ситуации, такие как боль, травма или эмоциональный стресс, также могут стимулировать секрецию вазопрессина. Обычно это происходит за счет активации оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники в ответ на стресс. После секреции вазопрессина в кровь он попадает в почки, где оказывает действие на сосудистые рецепторы и эпителиальные клетки собирательных трубочек. В результате воздействия вазопрессина на почки происходит усиление реабсорбции воды из мочи обратно в кровь, что приводит к уменьшению объема и концентрации мочи. Концентрация натрия в плазме (также известная как натриемия) играет ключевую роль в регулировании водного баланса и осмотического давления в организме. Натрий — один из основных электролитов, присутствующих во внеклеточной жидкости, и его концентрация тщательно регулируется органами и системами организма. Концентрация натрия влияет на осмотическое давление внеклеточной жидкости, которое, в свою очередь, регулирует

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

распределение воды между клетками и внеклеточным пространством. Высокая концентрация натрия в крови заставляет организм удерживать воду, тогда как низкая концентрация натрия стимулирует организм терять воду. Концентрация натрия в плазме тщательно контролируется системами регуляции водного баланса, включая антидиуретический гормон (вазопрессин), альдостерон и ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Эти механизмы контролируют реабсорбцию натрия в почках и его выведение из организма через мочу для поддержания оптимального уровня натрия в крови. Изменения концентрации натрия в крови могут быть индикаторами различных патологических состояний, таких как обезвоживание, гипонатриемия (низкая концентрация натрия) или гипернатриемия (высокая концентрация натрия). Эти изменения могут иметь серьезные последствия для организма, включая дисбаланс жидкости, неврологические осложнения и даже потенциально опасные для жизни последствия. Концентрацию натрия в плазме обычно измеряют в миллимоль на литр (ммоль /л) с помощью биохимического анализа крови. Нормальные концентрации натрия варьируются, но обычно составляют около 135–145 ммоль /л. Таким образом, концентрация натрия в плазме крови играет важную роль в регуляции водного баланса и поддержании гомеостаза в организме, а ее контроль и диагностика имеют большое клиническое значение. Для пояснения смысла этого нового понятия следует сказать несколько слов о неодинаковой роли в осмоляльности плазмы крови отдельных осмотически активных веществ, таких как натрий, глюкоза, мочевина и калий. Эти вещества являются не только осмолитами , но и участниками внутри- или внеклеточной осмоляльности.

Методы. Эксперимент проведен на 100 образцах крыс в условиях вивария. В исследовании участвовали 3-месячные крысы без зубов. На начальном этапе эксперимента всех животных помещали на недельный карантин, после чего, исключая случаи соматических или инфекционных заболеваний, разрешали перейти к обычному режиму вивария с трехразовым питанием. Для изучения влияния соли на функцию почек в экспериментальных группах животных использовали физиологический раствор следующей концентрации: Для изучения влияния соли на функцию почек был проведен эксперимент на животных. Эксперимент проводился по методике, предложенной Сандерсом (2004) и Ламберсом. Херспинк , Навис и Ритц (2012). В группе наблюдения, где ожидаемое суточное потребление натрия составляло от 4 до 5,99 г (что эквивалентно 10-15 г хлорида натрия в сутки), количество соли рассчитывали в мг/кг массы тела животного по формуле: Количество соль в мг/кг = Масса тела в кг / Количество потребленной соли в г. Например, если человек весит 70 кг и потребляет в день 7 г соли, то количество соли в мг/кг будет: Количество соли в мг/кг = 7000 мг/70 кг = 100 мг/кг. В ходе эксперимента группа животных ежедневно в течение определенного периода времени принимала по 15 г соли, растворенной в 500 мл воды, тогда как другая группа животных принимала соль в обычном режиме. Результаты показали, что у животных, потребляющих больше соли, наблюдалось повышение кровяного давления и отсутствие положительных изменений в функции почек. Также были выявлены проблемы, связанные с задержкой воды и образованием камней в почках. Этот эксперимент подтверждает возможность негативного влияния избыточного потребления соли на функцию почек и развитие различных заболеваний. Таким образом, контроль потребления соли считается важным аспектом поддержания здоровой функции почек. Когда дело доходит до потенциального воздействия соли на почки и

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

возможного образования камней из-за избытка соли и питьевой воды, это область, представляющая интерес для исследований.

При этом животных разделили на две группы и потенциально исследовали влияние соли на почки, а также потенциальное воздействие этих факторов через избыточное питание. Первая группа животных — контрольная, в которой ученые использовали стандартный рацион с нормальным содержанием соли, чтобы сравнить результаты с другими группами. Вторая группа животных потребляла в рационе среднее количество соленой воды, примерно 12-14 мл в сутки на каждые 100 граммов массы тела. Это количество воды было предоставлено на один месяц. Это может привести к различным последствиям, таким как повышение артериального давления и повреждение почек, связанное с задержкой воды и натрия в организме .

в эксперименте, но только один из них не завершил эксперимент.

Разделение животных на группы в зависимости от содержания эксперимента.

Группы _	Суть эксперимента.	Образцы экспериментальных крыс пятимесячного возраста.	Общий число из животные .
я	контрольная группа	50	50
II	Группа 2 взяла солевой раствор решение	50	50

В ходе эксперимента наблюдали за динамикой массы тела животных, их общим состоянием и поведением. Отмечено отсутствие каких-либо отклонений в общем состоянии и поведении животных. После этого животных тщательно взвешивали, затем акушерскими ножницами подрезали голову животным под наркозом, после чего вводили в эксперимент. Эксперименты по изучению биомедицинских характеристик проводились в соответствии с международными рекомендациями с использованием для лабораторных исследований лабораторных животных.

Методы исследования включали органометрические , гистологические, гистоморфометрические , микроскопические и статистические методы. С помощью органометрических , гистологических, гистоморфометрических и микроскопических методов проведены исследования морфогенеза почек (на уровне органа, ткани и клеток). Для обработки результатов исследования использовались статистические методы и данные. После удаления почек их взвешивали на лабораторных весах ВЛР-200 (2019 г.) с точностью 0,25 мг, а длину, ширину и толщину измеряли штангенциркулем с точностью 0,05 мм. Полученные данные фиксировались в протоколах отбора материалов.

Абсолютную и относительную массу и объем почек рассчитывали с использованием стандартной формулы эмпирических коэффициентов на основе сонографических данных.

Морфометрические показатели почек крыс контрольной группы

	Почка капсула толщина	Реналь кортикальный толщина	Почка мозговое вещество толщина

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Продолжительность из тот изучать	верши на полюс	воро та	ниже полю с	верши на полюс	ворот а	ниже полюс	верши на полюс	ворота	ниже полю с
3 месяца	7,93±0,63	10,11±0,55	7,65±0,79	263,49±11,59	312,69±9,22**	183,13±3,97***	295,75±13,01	352,05±8,30***	219,76±5,07**

Примечание: * - отмечена достоверность разницы по сравнению с предыдущим периодом исследования (P<0,05; ** - P<0,01; * - P<0,001).**

Здесь использовалась формула: V = 0,523×a×b×c, где a – длина, b – ширина, c – толщина бутона. После органометрии почки консервировали в 10% нейтральном растворе формалина. После фиксации препараты замачивали в воде в течение часа по стандартной методике, заключающейся в обезвоживании в спиртовом растворе и последующем заключении в парафиновые блоки. Затем с помощью микротома МС-2 готовили парафиновые срезы толщиной 4-6 мкм , окрашивали гематоксилин-эозином и методом Ван- Гизона . Срезы исследовали морфометрическим методом с использованием окуляр-микрометра DN-107T/Model NLSD-307B («Nobel» , Китай). Почечные капсулы, артериальные сосуды, проксимальные и дистальные канальцы измеряли по диаметру, а также измеряли размеры частей органов.



Когда организму необходимо удерживать воду, мозговые отделы почек создают высокий осмотический градиент, что приводит к задержке осмотически свободной воды и концентрированной мочи. И наоборот, когда организму необходимо избавиться от лишней воды, мозговые области создают более низкий осмотический градиент, что способствует растворению осмотически свободной воды и образованию разбавленной мочи. Убедительно доказано, что потребление NaCl в количествах более 5 г/сут является фактором риска возникновения и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Представлены эпидемиологические данные относительно потребления NaCl в различных странах и регионах мира, обозначены проблемы выявления факта злоупотребления NaCl . Рассмотрены наиболее успешные модели и стратегии профилактики, направленные на ограничение потребления поваренной соли. Почки фильтруют кровь и удаляют избыток натрия и других веществ через мочу. Однако если вы потребляете слишком много соли, ваши почки могут испытывать повышенную нагрузку, что может привести к повреждению почечной ткани и развитию почечной недостаточности. Высокое потребление соли может способствовать образованию камней в почках. Это связано с тем, что избыток натрия в моче может привести к повышению

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


VOLUME-5, ISSUE-4

концентрации кальция и других минералов, что способствует образованию камней. Особенно важен контроль натрия у людей с гипертонией или другими заболеваниями почек. Высокое потребление соли может ухудшить симптомы этих заболеваний и увеличить риск осложнений. Избыток соли также может повлиять на функцию мочевыводящих путей, увеличивая риск развития инфекций мочевыводящих путей и других заболеваний. Задержка воды при синдроме Лиддла происходит в результате нарушения реабсорбции натрия. Сопровождается гипокалиемией, метаболическим алкалозом, снижением ренина и альдостерона в плазме крови.

Морфометрические параметры почек крыс опытной группы

Продолжительность изучать	Капсула толщина			Кора головного мозга			Мозг иметь значение		
	вершина полюс	ворота	ниже полюс	вершина полюс	ворота	ниже полюс	вершина полюс	ворота	ниже полюс
3 месяца	9,02 ±0,82**	12,03 ±0,85**	8,20 ±0,80*	290,28±12,13*	332,92 ±8,50***	212,11 ±6,34***	324,17 ±13,36**	370,64 ±8,77***	239,44 ±4,02***

Полученные результаты. Повреждение почек солью может привести к различным заболеваниям, таким как камни в почках, почечная недостаточность и другие проблемы мочеполовой системы. Основной механизм воздействия соли на почки – увеличение объема крови. Увеличение количества соли заставляет организм задерживать воду, что увеличивает объем крови. Увеличение объема крови оказывает давление на стенки кровеносных сосудов и увеличивает нагрузку на почки — органы, отвечающие за фильтрацию крови и удаление лишней воды и отходов. Хроническое употребление соли может привести к развитию ряда проблем с почками. Во-первых, высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды почек, что приведет к ухудшению функции почек. Во-вторых, избыток соли способствует образованию камней в почках. Увеличение количества натрия в моче может привести к накоплению солей, которые могут образовывать камни в почках.



ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

В заключение, чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на почки, приводя к повышению артериального давления и повреждению кровеносных сосудов, а также к образованию камней в почках. Поэтому ограничение потребления соли и употребление достаточного количества воды важно для поддержания здоровья почек.




Рисунок 2. Микроскопическая картина почечной недостаточности (в проксимальных и дистальных канальцах выявляются гидропическая дистрофия и ядерный некроз (1). Выявляются вакуольная дистрофия и очаги кариолиза (2). Окраска гематоксилин-эозином, 10x10).

Обсуждение. Чрезмерное потребление соли в рационе может иметь серьезные негативные последствия для здоровья. Одним из главных вредов чрезмерного потребления соли является ее связь с повышением артериального давления. Слишком большое количество натрия в организме может привести к задержке жидкости в тканях, что увеличивает объем крови в сосудах и, следовательно, увеличивает давление на стенки артерий. Высокое кровяное давление увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт и аритмии. Чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на функцию почек. Почки играют важную роль в регулировании уровня натрия в организме, и слишком много соли может их перегрузить и повредить. Высокий уровень соли в организме может привести к потере кальция с мочой, что, в свою очередь, может увеличить риск развития остеопороза и других заболеваний костей. Некоторые исследования связали избыточное потребление соли с повышенным риском рака желудка. Чрезмерное употребление соли может привести к задержке жидкости в тканях, что проявляется отеками и отечностью. Чрезмерное потребление соли может ухудшить состояние кожи, вызывая отечность и раздражение.

Таким образом, исследования показывают, что диета с высоким содержанием хлорида натрия (NaCl) может иметь негативные последствия для здоровья человека. Повышенное потребление соли может привести к множеству проблем, включая высокое кровяное давление, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт, а также повышенный риск заболеваний почек и остеопороза. Поэтому важно умерить потребление соли и выбирать более здоровые альтернативы, например, использовать специи и травы для придания вкуса пище, а также есть больше свежих фруктов и овощей. Уменьшение потребления соли может значительно снизить риск развития серьезных заболеваний и помочь сохранить общее состояние здоровья.

Литературы.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

1. Хикматова, М. Ф. (2021). Взгляд Ибн Сино о проведении опорожнения. Science and Education, 2(9), 72-78.

2. Хикматова, М. Ф. (2023). ВЛИЯНИЕ МАСЛА ГРАНАТОВОХ КОСТОЧЕК НА СЕЛЕЗЁНКУ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. Биология и интегративная медицина, (S), 36-45.

3. Хикматова, М. Ф. (2023). Влияние масло гранатовох косточек на тимус при почечной недостаточности. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(7), 163-171.

4. Хикматова, М. Ф. (2023). ВЛИЯНИЕ МАСЛА ГРАНАТОВОХ КОСТОЧЕК НА СЕЛЕЗЁНКУ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. Биология и интегративная медицина, (S), 36-45.

5. Хикматова, М. (2021). Лёгкая атлетика–ключ здоровья. Общество и инновации, 2(8/S), 439-443.

6. Хикматова, М. Ф. (2022). Лечебные Свойство Гранатовых Косточек. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(10), 242-245.

7. Хикматова, М. Ф. (2023). МАСЛО ИЗ ГРАНАТОВЫХ КОСТОЧЕК (PUNICA GRANATUM L.), ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(10), 207-213.

8. Хикматова, М. Ф. (2022). О Методах Общего Лечения, Кровеносные Сосуды Для Кровопускания. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(6), 24-31.

9. Хикматова, М. Ф. (2023, October). ПОЛУЧЕНИЕ МАСЕЛ ИЗ ГРАНАТОВЫХ КОСТОЧЕК (PUNICA GRANATUM L.), ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 4, pp. 16-19).

10. Хикматова, М. Ф. (2022). Симптомы Болезней Сердца И Общие Методы Лечения В Учении Ибн Сины. Miasto Przyszłości, 25, 221-222.

11. Фуркатовна, Х. М. (2023). Симптомы Болезней Сердца И Общие Методы Лечения В Учении Ибн Сины.

12. Тешаев, Ш. Ж., Хамдамова, М. Т., & Хикматова, М. Ф. (2024, February). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК: ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ВОДНО-СОЛЕВОГО ГОМЕОСТАЗА. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 2, No. 2, pp. 101-109).

13. Хикматова, М. Ф. (2022). Чай-Личебно Профилактическое Средство Для Желудка. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(6), 12-14.

14. Hikmatova, M. F., & Khamdamova, M. T. (2021). Morphometric features of anthropometric parameters of adolescents living in the city of Bukhara engaged in athletics. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 492-495.

15. Hikmatova, M. F., & Khamdamova, M. T. (2021). A study of morphometric features of anthropometric parameters of adolescents living in the city of Bukhara engaged in athletics. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 215-217.

16. Тешаев, Ш. Ж., Хамдамова, М. Т., & Хикматова, М. Ф. (2023). СОЛЬ И ПОЧКА. КОРРЕКЦИЯ С МАСЛОМ КОСТОЧЕК ГРАНАТА. JOURNAL OF NURSING AND WOMEN'S HEALTH, 6(5), 9-14.

17. Bobonatharovich, D. S., & Furkatovna, K. M. (2024). Effect of pomegranate seed oil on the urinary system. International Journal of Formal Education, 3(6), 175-181.

18. Furkatovna, K. M. (2022). Healing Properties of Pomegranate Seeds. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(10), 242-245.

19. Izatulloyevna, T. Z., Azimovna, A. N., Avazxonovna, S. G., & Furqatovna, H. M. (2018). Health status of Scool children depending on health care activities of families. European science review, (9-10-2), 164-166.

20. Furkatovna, H. M. (2021). MEDICINAL PLANTS FOR BLOOD THINNING IN PREGNANT WOMEN. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(1), 5-7.

21. Khikmatova, M. F. (2022). Medicinal Properties of Pomegranate Seeds. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(10), 242-245.

22. Hikmatova, M. F. (2022). Methods of General Treatment. Blood Vessels for Bloodletting//Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(6), 24-31.

23. Hikmatova, M. F., & Khamdamova, M. T. (2021). Morphometric features of anthropometric parameters of adolescents living in the city of Bukhara engaged in athletics. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 492-495.

24. Hikmatova, M. F., & Khamdamova, M. T. (2021). Morphometric features of anthropometric parameters of adolescents living in the city of Bukhara engaged in athletics. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 492-495.

25. Furkatovna, H. M. (2021). Pakistan pharmaceutical stocks behavior during covid19. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(1), 8-10.

26. Hikmatova, M. F. (2022). Pomegranate Fruits in the Prevention and Treatment of Kidney Diseases. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 423-426.

27. To'xtasinovna, H. M. (2023). POMEGRANATE SEED OIL (PUNICA GRANATUM L.), STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(9), 11-15.

28. Furkatovna, H. M., & To'xtasinovna, H. M. (2023). POMEGRANATE SEED OIL, STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(10), 316-321.

29. Zhumaevich, T. S., Tukhtasinovna, K. M., & Furkatovna, K. M. (2023). Protective effect of pomegranate seed oil against salt toxicity in rat kidneys. Texas Journal of Medical Science, 27, 57-59.

30. Kayumov, K. N., Xikmatova, M. F., Dgabborova, M. B., & Sulnova, L. G. (2020). State of integration of traditional iu cine in the modern system of health care for guards uu health of women of reproductive age. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(3), 3148-3153.

31. Khikmatova, M. F. (2022). Study of the Effect of Pomegranate Oil on the Immunological State in Experimental Animals. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(7), 137-140.

32. Hikmatova, M. F. (2022). Symptoms of Heart Diseases and General Treatment Methods in the Teachings of Ibn Sina. Miasto Przyszłości, 25, 221-222.

33. The Influence of Pomegranate Seed Oil on the Spleen in Case of Kidney Insufficiency

34. Furkatovna, H. M. (2021). To study the anthropometric parameters of children and adolescents involved in athletics.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-4

35. Furkatovna, H. M. (2021). To study the morphometric features of the anthropometric parameters of children and adolescents involved in athletics. Биология и интегративная медицина, (1 (48)), 7-14.

36. Hikmatova, M. F. (2022). Treatment and Prevention of Kidney Diseases with Herbs. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 426-429.