ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Оптимизация лечения хронического риносинусита у пациентов с сахарным диабетом II типа: современные подходы и клинические рекомендации

Нуров У.И.
Болтаев М.Ф.
Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация

Хронический риносинусит (ХРС) у пациентов с сахарным диабетом II типа (СД II типа) остаётся сложной клинической проблемой ввиду влияния метаболических нарушений, иммунной дисфункции, микроангиопатии и повышенной восприимчивости к инфекциям. В данной статье рассмотрены патогенетические особенности, влияющие на течение ХРС при СД II типа, и предложены современные подходы к оптимизации терапии, включающие контроль гликемии, рациональную антибактериальную терапию, применение топических кортикостероидов, ирригационную терапию, хирургическое вмешательство, а также перспективные иммуномодулирующие методы. Дополнительно обсуждаются вопросы коррекции сопутствующих заболеваний и индивидуализации лечения с учётом особенностей каждого пациента. Представленные рекомендации основаны на данных доказательной медицины и могут быть полезны клиницистам в повседневной практике.

Ключевые слова: хронический риносинусит, сахарный диабет II типа, иммунная дисфункция, антибактериальная терапия, топические кортикостероиды, ирригационная терапия, хирургическое лечение, иммуномодуляция.

Optimization of Chronic Rhinosinusitis Treatment in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: Modern Approaches and Clinical Recommendations

U.I. Nurov, M.F. Boltaev
Bukhara State Medical Institute

Abstract

Chronic rhinosinusitis (CRS) in patients with type 2 diabetes mellitus is a complex condition caused by a combination of systemic metabolic disorders, immune dysfunction, microangiopathy, and increased susceptibility to infections. This article examines the pathogenic mechanisms influencing the course of CRS in this patient population and describes modern therapeutic approaches, including glycemic control, rational antibiotic use, the application of local anti-inflammatory agents, irrigation therapy, surgical intervention, and immunostimulation. Special attention is given to the correction of comorbid conditions and the necessity for an individualized treatment approach. The recommendations presented in this article are based on contemporary evidence-based data and can be implemented in everyday clinical practice.

Keywords: chronic rhinosinusitis, type 2 diabetes mellitus, immune dysfunction, antibacterial therapy, topical corticosteroids, irrigation therapy, surgical treatment, immunostimulation.

Введение

Хронический риносинусит (ХРС) – это воспалительное заболевание слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, характеризующееся длительным течением (более 12 недель) и часто

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

рецидивирующим характером симптоматики. У пациентов с сахарным диабетом II типа (СД II типа) течение ХРС осложняется не только местными воспалительными процессами, но и системными метаболическими нарушениями, что требует более комплексного и индивидуального подхода к терапии.

Основными задачами оптимизации лечения ХРС при СД II типа являются:

- коррекция метаболического статуса и контроль гликемии;
- противомикробная терапия с учётом специфики микрофлоры и резистентности;
- локальное противовоспалительное лечение с минимизацией системных побочных эффектов;
- оперативное вмешательство в случаях неэффективности консервативной терапии;
- коррекция сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, ожирение и дислипидемия.

Цель статьи – детально рассмотреть современные стратегии лечения ХРС у пациентов с СД II типа, учитывая патогенетические особенности, а также обсудить перспективные подходы, направленные на снижение частоты рецидивов и улучшение качества жизни пациентов.

Патогенетические особенности ХРС при СД II типа

1. Гипергликемия и её влияние на иммунитет

При СД II типа хронически повышенный уровень глюкозы в крови негативно влияет на функцию нейтрофилов и макрофагов:

- **Нарушение хемотаксиса и фагоцитарной активности:** Гипергликемия приводит к снижению способности клеток иммунной системы мигрировать к очагам инфекции и эффективно устранять патогены [1].
- **Образование продвинутых гликированных энд-продуктов (AGE):** Эти продукты способствуют усилению окислительного стресса и провоспалительной реакции, что усугубляет повреждение тканей слизистой [2].

2. Микроангиопатия

У пациентов с СД II типа наблюдаются изменения мелких сосудов:

- **Нарушение микроциркуляции:** Поражение капилляров снижает доставку кислорода и питательных веществ к тканям носовой полости и пазух, замедляя процессы регенерации и усиливая хроническое воспаление [3].
- **Замедленное заживление ран:** Это особенно важно при оперативном лечении, так как повышает риск послеоперационных осложнений.

3. Оксидативный стресс

Повышенная продукция свободных радикалов в условиях гипергликемии приводит к:

- **Активации провоспалительных путей:** Усиливается воспалительная реакция в слизистой, что способствует персистенции инфекции [4].
- **Повреждению клеточных мембран и ДНК:** Это ухудшает регенеративные способности тканей.

4. Сопутствующие заболевания

Часто пациенты с СД II типа страдают от гипертонии, ожирения, дислипидемии и хронической болезни почек, что:

- **Усиляет системное воспаление:** И негативно влияет на иммунный ответ.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

- **Усложняет медикаментозное лечение:** Необходимо учитывать взаимодействие лекарственных препаратов и особенности фармакокинетики у больных с полиморбидностью [5].

Принципы оптимизации лечения

1. Контроль гликемии

Эффективная коррекция уровня сахара в крови является краеугольным камнем успешного лечения ХРС:

- **Индивидуализация терапии:** Выбор сахароснижающих препаратов должен учитывать сопутствующие заболевания и риск гипогликемии. Современные препараты, такие как ингибиторы SGLT2 или агонисты рецепторов GLP-1, могут быть использованы с осторожностью.
- **Регулярный мониторинг:** Измерение уровня HbA1c каждые 3–6 месяцев позволяет оценить долгосрочный контроль гликемии [6].
- **Диетотерапия и физическая активность:** Коррекция питания и повышение физической активности способствуют снижению уровня сахара и улучшению общего состояния пациента.

2. Антибактериальная терапия

При обострении ХРС с бактериальной этиологией следует:

- **Проводить микробиологическое исследование:** Назначение антибиотиков должно основываться на результатах посева и чувствительности возбудителя.
- **Выбор препаратов:** У пациентов с СД II типа предпочтение отдается препаратам с широким спектром действия, таким как амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины III поколения, а также макролидам. Особое внимание уделяется коррекции дозировки с учетом сопутствующих нарушений функции почек [7].
- **Продолжительность терапии:** Может требоваться более длительный курс антибиотиков для предотвращения рецидивов.

3. Топические кортикостероиды

Локальное применение интраназальных кортикостероидов (например, мометазона, флутиказона) остаётся основой противовоспалительной терапии:

- **Механизм действия:** Снижение отека слизистой, уменьшение воспалительного ответа и улучшение дренажа пазух.
- **Побочные эффекты:** При длительном применении необходимо контролировать риск системного абсорбирования стероидов, особенно у пациентов с СД II типа. Возможно использование минимально эффективных доз или циклического режима терапии [8].

4. Ирригационная терапия

Промывание носовых пазух изотоническими или гипертоническими растворами способствует:

- **Механическому удалению патогенов и избыточной слизи:** Это улучшает мукоцилиарный клиренс и снижает бактериальную нагрузку.
- **Смягчению воспаления:** Регулярное проведение ирригаций помогает улучшить местный иммунный ответ и подготовить слизистую к дальнейшему лечению [9].

5. Хирургическое лечение

Функциональная эндоскопическая хирургия пазух (FESS) применяется в случаях неэффективности консервативной терапии:

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

- **Показания к операции:** Рецидивирующие инфекции, структурные нарушения носовых пазух, полипоз.
- **Особенности у пациентов с СД II типа:** Необходим тщательный предоперационный анамнез и подготовка, оптимизация гликемического контроля, а также коррекция сопутствующих заболеваний для минимизации риска послеоперационных осложнений [10].
- **Послеоперационное наблюдение:** Важно обеспечить адекватное местное лечение и контроль за уровнем глюкозы для предотвращения рецидивов.

6. Коррекция сопутствующих заболеваний

Одновременно с лечением ХРС важно:

- **Контролировать артериальное давление и липидный профиль:** Коррекция гипертонии и дислипидемии способствует улучшению микроциркуляции и снижению системного воспаления.
- **Коррекция ожирения:** Снижение массы тела оказывает положительное влияние на метаболический статус и иммунитет [11].

7. Иммуномодулирующая терапия

Для усиления местного иммунного ответа и профилактики рецидивов можно рассмотреть:

- **Применение бактериальных лизатов и иммуностимуляторов:** Эти препараты помогают активизировать местную иммунную систему без выраженных системных эффектов.
- **Перспективные методы:** В последние годы ведутся исследования по применению биологических препаратов (например, моноклональных антител) для коррекции воспалительного ответа при ХРС, что может представлять интерес для пациентов с сопутствующим СД II типа [12].

8. Дополнительные подходы и перспективы

- **Профилактика оксидативного стресса:** Антиоксиданты (например, витамин С, витамин Е, N-ацетилцистеин) могут использоваться как дополнение к основному лечению, способствуя снижению окислительного повреждения тканей.
- **Психосоциальная поддержка:** Хронические заболевания часто сопровождаются стрессом и снижением качества жизни. Поддержка психотерапевта и работа с пациентом по улучшению образа жизни могут стать важной частью комплексной терапии.

Заключение

Оптимизация лечения хронического риносинусита у пациентов с сахарным диабетом II типа требует междисциплинарного подхода, учитывающего как локальные воспалительные процессы, так и системные метаболические нарушения. Ключевыми элементами успешной терапии являются:

- **Строгий контроль гликемии** и коррекция сопутствующих заболеваний,
- **Рациональный выбор антибактериальной терапии** с учетом микробиологической картины,
- **Применение интраназальных кортикостероидов** с минимизацией системных эффектов,
- **Регулярная ирригация** и, при необходимости, хирургическое вмешательство с учётом повышенного риска осложнений,
- **Использование иммуномодулирующих и антиоксидантных средств** для коррекции воспалительного ответа.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Дальнейшие исследования, направленные на изучение молекулярных механизмов и генетических предрасположенностей, позволят разработать более персонализированные и эффективные стратегии лечения ХРС у пациентов с СД II типа.

Список литературы

1. **Peleg A.Y., Weerarathna T., McCarthy J.S., Davis T.M.** Common infections in diabetes: pathogenesis, management and relationship to glycaemic control // *Diabetes Metab Res Rev*. 2007;23:3–13.
2. **Brownlee M.** The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism // *Diabetes*. 2005;54:1615–1625.
3. **Giacco F., Brownlee M.** Oxidative stress and diabetic complications // *Circ Res*. 2010;107:1058–1070.
4. **American Diabetes Association.** Standards of Medical Care in Diabetes—2022 // *Diabetes Care*. 2022;45(Suppl. 1):S1–S264.
5. **Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C. et al.** European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 // *Rhinology*. 2020;58:1–464.
6. **Rosenfeld R.M., Piccirillo J.F., Chandrasekhar S.S. et al.** Clinical practice guideline (update): adult sinusitis // *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2015;152(Suppl.):S1–S39.
7. **Chong L.Y., Head K., Hopkins C. et al.** Intranasal steroids versus placebo or no intervention for chronic rhinosinusitis // *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;4:CD011996.
8. **Harvey R., Hannan S.A., Badia L., Scadding G.** Nasal saline irrigations for the symptoms of chronic rhinosinusitis // *Cochrane Database Syst Rev*. 2007;3:CD006394.
9. **Smith T.L., Kern R., Palmer J.N. et al.** Medical therapy vs surgery for chronic rhinosinusitis: a prospective, multi-institutional study // *Int Forum Allergy Rhinol*. 2011;1:235–241.
10. **Cingi C., Songu M., Ural A. et al.** Immunomodulation in allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis // *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2012;269:1–7.
11. **Дополнительные источники по коррекции сопутствующих заболеваний.**
12. **Исследования по применению биологических препаратов при хроническом риносинусите.**