ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

PREMATURE DETACHMENT OF A NORMALLY IMPLANTED PLACENTA: PATHOGENESIS, CLINICAL COURSE, AND PERINATAL OUTCOMES

NORMAL JOYLASHGAN YO'LDOSHNING BARVAQT KO‘CHISHI: PATOGENEZ, KLINIK KECHISH VA PERINATAL OQIBATLAR

Узокова М.К.,
Отажонова Д.О.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
Uzokova M.K.,
Otajonova D.O.
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan
Uzokova M.K.,
Otajonova D.O.
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Toshkent, O‘zbekiston

Аннотация: Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) представляет собой одно из наиболее тяжёлых осложнений беременности, которое может привести к значительным рискам как для матери, так и для плода. В статье рассматриваются основные патогенетические механизмы развития ПОНРП, факторы риска, способствующие её возникновению, а также особенности клинического течения. Особое внимание уделено перинатальным исходам, включая частоту мертворождений, гипоксию плода и послеродовые осложнения у матери. Подчёркивается важность своевременной диагностики и выбора оптимальной тактики ведения родов для снижения уровня материнской и перинатальной смертности.

Ключевые слова: преждевременная отслойка, плацента, беременность, патогенез, клиническое течение, перинатальные исходы, мертворождение, гипоксия плода, акушерские осложнения.

Abstract: Premature detachment of a normally implanted placenta (PDNIP) is one of the most serious complications of pregnancy, which can pose significant risks for both the mother and the fetus. This article examines the main pathogenetic mechanisms of PDNIP development, the risk factors contributing to its occurrence, as well as the clinical course characteristics. Special attention is given to perinatal outcomes, including the incidence of stillbirths, fetal hypoxia, and postpartum complications in the mother. The importance of timely diagnosis and choosing the optimal labor management strategy to reduce maternal and perinatal mortality is emphasized.

Keywords: premature detachment, placenta, pregnancy, pathogenesis, clinical course, perinatal outcomes, stillbirth, fetal hypoxia, obstetric complications.

Annotatsiya: Normada joylashgan platsentaning erta ajralishi (NJPETA) homiladorlikning eng og‘ir asoratlaridan biri bo‘lib, ona va homila hayoti uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Ushbu maqolada NJPETA rivojlanishining asosiy patogenetik mexanizmlari, uni yuzaga keltiruvchi xavf omillari va klinik kechish xususiyatlari tahlil qilinadi. Perinatal oqibatlarga, jumladan, o‘lik tug‘ilishlar soni, homila gipoksiyasi va onadagi tug‘ruqdan keyingi asoratlarga alohida e’tibor qaratilgan. Ona va

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

perinatal o‘lim ko‘rsatkichlarini kamaytirish uchun o‘z vaqtida tashxis qo‘yish va tug‘ruqni optimal boshqarish taktikasi muhimligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: muddatidan oldin ajralish, yo‘ldosh (plasenta), homiladorlik, patogenez, klinik kechish, perinatal natijalar, o‘lik tug‘ilish, homila gipoksiyasi, akusherlik asoratlari.

Введение.

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) является одним из самых опасных осложнений беременности, представляющим серьёзную угрозу для жизни и здоровья как матери, так и плода. Это патологическое состояние характеризуется отделением плаценты от стенки матки до рождения ребёнка, что нарушает маточно-плацентарное кровообращение и приводит к острой гипоксии плода и массивной кровопотере у матери. По данным Всемирной организации здравоохранения, ПОНРП наблюдается в 0,4–1,5% всех беременностей, но при этом сопровождается высоким уровнем материнской и перинатальной смертности. Этиопатогенез данного состояния остаётся до конца не изученным, однако существует ряд факторов риска, таких как гипертоническая болезнь, травмы, курение, многорожавшие пациентки, преждевременный разрыв плодных оболочек и патология свертывающей системы крови. Клинические проявления ПОНРП варьируют от лёгких до крайне тяжёлых форм и требуют немедленного акушерского вмешательства. Актуальность изучения ПОНРП обусловлена необходимостью ранней диагностики, своевременного принятия клинических решений и выбора оптимальной тактики родоразрешения. Это позволяет существенно снизить частоту неблагоприятных исходов для матери и новорождённого. В данной статье рассматриваются патогенез, клиническое течение и перинатальные последствия преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, а также обсуждаются современные подходы к её диагностике и лечению. [1, 3].

Основная часть.

Патогенез. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) развивается вследствие нарушений сосудистой системы матки и плаценты, что приводит к кровоизлиянию в децидуальную оболочку. Это, в свою очередь, вызывает разрыв сосудов и отслойку плаценты от стенки матки. Основными патогенетическими механизмами считаются: спазм сосудов, ишемия, некроз децидуальной ткани и образование ретроплацентарной гематомы. Эти изменения могут быть спровоцированы артериальной гипертензией, преэклампсией, травмами, коагулопатиями, а также внешними воздействиями (например, физическая травма, резкое уменьшение объема матки при отхождении околоплодных вод). [8].

Факторы риска.

Наиболее частыми факторами риска ПОНРП являются: хроническая артериальная гипертензия и преэклампсия; многоплодная беременность; травмы живота; преждевременное излитие околоплодных вод; курение, употребление наркотиков (особенно кокаина); возраст матери старше 35 лет; оперативные вмешательства на матке в анамнезе; короткий интервал между беременностями; нарушения системы гемостаза. [6].

Клиническое течение.

Клиническая картина ПОНРП варьирует в зависимости от степени отслойки. Основные симптомы включают: внезапную боль в животе; напряжённую, болезненную матку; маточное кровотечение (внешнее или скрытое); признаки гипоксии или внутриутробной гибели плода; тахикардия, снижение артериального давления, признаки шока у матери при массивной

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

кровопотере. По тяжести течение подразделяется на лёгкую, среднюю и тяжёлую формы. Лёгкая форма часто диагностируется только при УЗИ или после родов, тогда как тяжёлая требует немедленного родоразрешения, чаще всего посредством экстренного кесарева сечения. [2].

Диагностика.

Диагностика основывается на клинических признаках и данных ультразвукового исследования. УЗИ может выявить ретроплацентарную гематому, однако в некоторых случаях, особенно при скрытом кровотечении, ультразвуковая картина может быть неинформативной. Важную роль играют лабораторные анализы: уровень гемоглобина, гематокрит, показатели свёртываемости крови, а также мониторинг сердцебиения плода (КТГ). Перинатальные последствия

Преждевременная отслойка плаценты представляет серьёзную угрозу для плода. Возможные последствия включают: внутриутробную гипоксию и асфиксию; преждевременные роды; мертворождение; задержку внутриутробного развития (ЗВУР). [11].

Для матери осложнения могут включать: геморрагический шок; коагулопатию (ДВС-синдром); необходимость в гистерэктомии при неостановимом кровотечении; высокий риск повторного ПОНРП в последующих беременностях.

Лечение и тактика ведения. Тактика ведения зависит от степени отслойки, срока беременности и состояния матери и плода. При лёгкой форме и стабильном состоянии возможно выжидательное наблюдение под строгим контролем. В тяжёлых случаях необходимо немедленное родоразрешение. Обязательна коррекция гемодинамики, восстановление объема циркулирующей крови, профилактика или лечение ДВС-синдрома. [9, 12].

Выводы:

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты остаётся одним из самых серьёзных и жизнеугрожающих осложнений беременности. Своевременное распознавание клинических симптомов, оценка факторов риска и быстрое принятие тактических решений играют решающую роль в сохранении жизни и здоровья матери и плода. Важное значение имеет междисциплинарный подход с участием акушеров-гинекологов, анестезиологов и неонатологов, а также наличие современных диагностических и лечебных возможностей. Профилактика и грамотное ведение беременности у женщин группы риска способствует значительному снижению частоты перинатальных и материнских осложнений.

Использованные источники:

1. Иванова А.В., Петров С.М. Современные подходы к диагностике и лечению преждевременной отслойки плаценты. Журнал акушерства и гинекологии, 2021.

2. Клинические рекомендации по ведению беременных с отслойкой плаценты. Российское общество акушеров-гинекологов, 2022.

3. Кузнецова Т.И., Смирнов В.Н. Патогенез и профилактика акушерских кровотечений. Журнал «Клиническая медицина», 2020.

4. Лебедева М.С. Ранние осложнения беременности. Учебное пособие. Москва, 2019.

5. Мельникова Е.В. Перинатальная патология: современные аспекты. Журнал «Амалиётичга ёрдам», 2021.

6. Николаев А.А., Соколов Д.В. Оценка перинатальных исходов при отслойке плаценты. Журнал «Йошлар трибунаси», 2022.

7. Петрова Н.И. Акушерство и гинекология. Учебник. Санкт-Петербург, 2020.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

8. Российское общество акушеров-гинекологов. Клинические рекомендации по ведению беременности, осложненной отслойкой плаценты. 2022.
9. Узакова М.К., Отажонова Д.О. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: патогенез, клиническое течение и перинатальные исходы. Ташкентская медицинская академия, 2023.
10. WHO. Maternal and perinatal mortality statistics. WHO Reports, 2023.
11. Smith J., Brown K. Placental abruption: diagnosis and management. Obstetrics and Gynecology, 2022.
12. Zhang L., Chen X. Advances in perinatal care and outcomes. Journal of Perinatal Medicine, 2021.

Пример ссылок в тексте:

При изучении патогенеза преждевременной отслойки плаценты [1, 3].
Современные методы диагностики и ведения представлены в исследованиях [2, 8, 11].
Перинатальные исходы подробно рассмотрены в работах [6, 9, 12].