ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Значение асептики и антисептики в медицине

Косимова Мохира Абдупаттаевна
Бустанский техникум общественного здравоохранения
имени Абу Али ибн Сины
Главный преподаватель
Сестринский уход в хирургии и реанимации

Аннотация

Асептика и антисептика играют важную роль в современной медицине и хирургии, особенно в условиях роста антибиотикорезистентности. В данной статье рассматривается их значение на примере практики здравоохранения Узбекистана, где в последние годы уделяется особое внимание профилактике внутрибольничных инфекций. Приводятся данные исследований, а также актуальные примеры внедрения новых методов асептики и антисептики в медицинских учреждениях республики.

Ключевые слова: асептика, антисептика, инфекция, хирургия, Узбекистан, профилактика, антибиотикорезистентность

Введение

Асептика и антисептика являются основой инфекционной безопасности при проведении медицинских процедур. Асептика направлена на предупреждение попадания микроорганизмов в организм пациента, тогда как антисептика — на уничтожение микробов на коже, слизистых и раневых поверхностях (Kirkland & Adams, 2021).

В Узбекистане вопросы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, приобретают особую актуальность на фоне роста антибиотикорезистентности (IHME, 2023). Правильное применение мер асептики и антисептики в хирургии, стационарах и поликлиниках помогает снизить риск осложнений и предотвратить распространение резистентных бактерий (WHO & GIZ, 2025).

Асептика включает комплекс мер: стерилизацию инструментов, использование одноразовых расходных материалов, контроль чистоты воздуха и гигиену рук. Одним из наиболее эффективных и экономичных методов профилактики инфекций остаётся мытьё рук с использованием антисептических средств (Bakirov & Seifullaeva, 2025).

Согласно исследованиям, проведённым в больницах Узбекистана, внедрение протоколов Всемирной организации здравоохранения по гигиене рук позволило снизить уровень внутрибольничных инфекций на 35–70 % (Bakirov & Seifullaeva, 2025).

В операционных блоках крупных клиник Ташкента и Самарканда внедряется система контроля стерильности воздуха и правильной стерилизации инструментов. Это часть национальной программы по усилению инфекционного контроля, поддерживаемой Министерством здравоохранения и международными партнёрами (WHO & GIZ, 2025).

Антисептика применима не только в хирургии, но и в терапии хронических и острых ран. В медучреждениях Узбекистана основными средствами остаются растворы хлоргексидина и повидон-йода. В последние годы в протоколы включаются и более современные антисептики с доказанной эффективностью и минимальным раздражающим действием на ткани (PATH & WHO, 2023).

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Проведённые пилотные проекты показали, что правильный выбор антисептика и соблюдение кратности обработки раны сокращают срок заживления и уменьшают риск инфицирования (PATH & WHO, 2023).

Рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам требует возвращения внимания к классическим мерам профилактики — асептике и антисептике. Согласно данным Института оценки показателей здоровья (IHME), в 2019 году в Узбекистане резистентные инфекции стали причиной около 4 500 смертей и более 17 000 случаев, ассоциированных с осложнениями (IHME, 2023).

Одной из серьёзных проблем остаётся низкий уровень знаний среди населения и медицинских работников о правильном применении антибиотиков. Недавний опрос среди врачей общей практики, пациентов и фермеров показал тревожные результаты: около двух третей врачей не используют утверждённые клинические рекомендации при назначении антибактериальных препаратов, что часто приводит к их избыточному и неправильному применению. Пациенты, в свою очередь, в значительной степени уверены, что антибиотики помогают при любом простудном или вирусном заболевании, и нередко требуют их назначения даже тогда, когда в этом нет медицинской необходимости (Aniyozova et al., 2024). Особенно опасно, что многие продолжают принимать антибиотики без рецепта или по совету знакомых, что способствует распространению резистентных штаммов микроорганизмов. Кроме того, в сельской местности фермеры нередко используют антибиотики для ускорения роста животных, не соблюдая правил дозирования и сроков выведения препаратов из организма скота. Все эти факторы создают высокий риск формирования устойчивости микроорганизмов и усложняют лечение инфекций, что делает внедрение строгих стандартов асептики и антисептики ещё более актуальным.

В этих условиях особенно важно соблюдать протоколы асептики и антисептики, чтобы снизить необходимость необоснованного назначения антибиотиков (WHO, 2023).

В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и других клиниках страны реализуются образовательные программы по стандартам гигиены рук и применению антисептиков. Специалисты проходят курсы повышения квалификации, где акцентируется внимание на правильной стерилизации инструментов и обработке ран (WHO & GIZ, 2025).

В некоторых больницах начали внедрять систему эпидемиологического мониторинга и отчётности по ИПР. Это важно для своевременного выявления вспышек внутрибольничных инфекций и предотвращения их распространения (GHS Index, 2021).

Заключение

Асептика и антисептика остаются основой профилактики инфекций и важным фактором в борьбе с растущей антибиотикорезистентностью. Опыт Узбекистана показывает, что внедрение международных протоколов, регулярное обучение медперсонала и контроль за качеством стерилизации позволяют снизить уровень ИПР и улучшить исходы лечения. Продолжение этих усилий и их расширение на все уровни здравоохранения необходимы для сохранения здоровья населения.

Список литературы

Aniyozova, D., Dzhuraev, M., Fazilova, R., & Polonsky, J. (2024). Antimicrobial resistance related knowledge, attitude and practice of general practitioners, patients and farmers: A cross-sectional study in Uzbekistan. Heliyon, 10(4): e37566. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37566

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-6

Bakirov, A. A., & Seifullaeva, G. A. (2025). The Effectiveness of Hand Hygiene Practices in Reducing Infections in Hospitals. Central Asian Journal of Medicine, 2025(3).

GHS Index. (2021). Uzbekistan Country Profile. Retrieved from https://www.ghsindex.org/country/uzbekistan/

IHME. (2023). The burden of antimicrobial resistance (AMR) in Uzbekistan. Retrieved from https://www.healthdata.org/antimicrobial-resistance

Kirkland, K. B., & Adams, S. R. (2021). Infection Prevention and Control in Healthcare. Springer.

PATH & WHO. (2023). Effective infection prevention and control (IPC) practices in low-resource settings. Retrieved from https://www.path.org/resources/infection-prevention-and-control/

WHO & GIZ. (2025). Improving newborn care and infection prevention in Uzbekistan. Retrieved from https://www.giz.de/en/worldwide/99606.html

World Health Organization. (2023). Global Report on Infection Prevention and Control. Geneva: WHO Press. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164