ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ UPUPA EPOPS В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рахмонов Рашид Рахимович, доцент кафедры биологии Бухарского государственного педагогического института

Аннотатция: В статье приведены подробные сведения о распространении, биологии и экологических особенностях птицы Upupa epops в Узбекистане. Сведения о размерах тела, биологии гнездования и хозяйственном значении этой птицы представлены на основе многолетних материалов. В частности, были приведены сведения, собранные из агроценозов Вобкента, Шафиркона, Когона, Бухарского района и территорий, прилегающих к пустыне.

Ключевые слова: Узбекистан, Бухара, Вабкент, Шафиркан, Каган, Африка, Европа, Азия, Распространение, Биология, Экология, Весна, Лето, Осень. Германия Прибалтика Россия Новгород, Ярославль, Татарстан и Башкортостан.

Abstract: The article provides detailed information on the distribution, biology and ecological characteristics of the bird Upupa epops in Uzbekistan. Information on the body size, nesting biology and economic importance of this bird is presented on the basis of long-term materials. In particular, information was collected from the agrocenoses of Vobkent, Shafirkon, Kogon, Bukhara district and territories adjacent to the desert.

Key words: Uzbekistan, Bukhara, Vabkent, Shafirkan, Kagan, Africa, Europe, Asia, Distribution, Biology, Ecology, Spring, Summer, Autumn. Germany Baltics Russia Novgorod, Yaroslavl, Tatarstan and Bashkortostan.

В нашей республике особое внимание уделяется совершенствованию нормативно-правовых документов, направленных на сохранение биоразнообразия, охрану и рациональное использование животного мира, реализации программных мероприятий. В частности, в результате проводимой в этом направлении работы видам, численность которых сокращается, присвоен статус охраняемых, расширяется площадь особо охраняемых природных территорий, созданы возможности для широкого общественного контроля в сфере охраны животного мира. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан поставлена задача «обеспечить комплексное и эффективное использование природного, минерального, промышленного, сельскохозяйственного, туристического и трудового потенциала каждого региона для ускоренного социально-экономического развития». Исходя из этих задач, большое значение приобретают научные исследования, направленные на изучение и обоснование фауны, биоэкологических особенностей и устойчивого использования охотничьих животных Бухарской области, а также на выявление и оценку воздействия антропогенных факторов на объекты охоты и среду их обитания.

Систематика

Царство Животные (Animalia)
Тип Хордовые (Chordata)
Класс Птицы (Aves)
Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes)
Семейство Удодовые (Upupidae)
Род Удоды (Upupa)
Вид Удод (Upupa epops)

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Подвид Обыкновенный удод (Upupa epops epops)

Обыкновенный удод встречается в степных, горных и предгорных районах Узбекистана. Длина тела в среднем 28 см, размах крыльев в среднем 13,5 см, вес до 70 г. Оперение белое, черно-полосатое, желтовато-коричневое, на голове корона (шапочка). Небольшая птица с тонким, слегка загнутым вниз клювом. Имеет полосатые черно-белые крылья, длинный тонкий клюв и длинный хохолок на голове. Крылья широкие, округлые, окрашены в контрастные черные и бело-желтые полосы. Цвет головы, шеи и груди варьируется от розового до каштанового в зависимости от подвида. Благодаря этим особенностям это одна из самых легко узнаваемых птиц. Хвост средней длины, черный с широкой белой полосой посередине. Брюшная часть тела розовато-красная, с черными продольными полосами по бокам. Темя на голове оранжево-красное, с черными кончиками перьев. Обычно оно загнуто вверх и имеет длину 5-10 см, но при приземлении птица расправляет его. Язык очень маленький, в отличие от многих других видов птиц. Ноги свинцово-серые, очень сильные, с короткими и тупыми когтями. Самцы и самки внешне не отличаются. Молодые птицы обычно окрашены в менее насыщенные цвета и имеют более короткий клюв и хохолок.

Обыкновенный удод питается, роясь в почве на открытых участках, на лугах или на голой земле. Длинным клювом он часто роется в навозе, мусорных кучах или гнилой древесине, делая неглубокие ямки в земле. Язык скунса короткий, поэтому он иногда не может проглотить добычу с земли — для этого птица подбрасывает ее в воздух, ловит и глотает.

Материалы и методы исследования: Lepipidae — вид птиц, относящийся к семейству врановых. Материалы по теме были собраны в населенных пунктах Вобкентского, Шофирконского, Когонского и Бухарского районов Бухарской области, а также в агроценозах пустынных территорий. Наблюдения и расчеты проводились на выделенных маршрутах и на стационарных пунктах наблюдений. Для определения протяженности маршрутов использовались шагомер и крупномасштабные карты. Протяженность маршрутов составляла до 1-5 км вдоль побережья на озерах охотничьих хозяйств и других озерах, при ширине маршрута 100-300 метров, в остальных местах длина маршрута составляла до 1-20 км, при ширине маршрута 50-200 метров. Учет проводился в светлое время суток с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00.

Обыкновенный удод 20 апреля 2018 года в селе Арметан Вобкентского района Бухарской области среди кучи камней, привезенных для строительства нового здания, нами было обнаружено гнездо с 5 яйцами. Гнездо было размещено на куче коровьего навоза. Было установлено, что никакой дополнительной подстилки в качестве строительного материала гнезда не использовалось, было сделано лишь небольшое углубление в навозе и отложены яйца. Мы заметили, что яйца скунса были продолговатыми и серовато-белого цвета. Размеры яиц следующие.

1. 26,4 x 18,8=4,4 гр
2. 26,4 x 18,9=4,5 гр
3. 26,5 x19,0=4,5 гр
4. 26,6 x 19,1=4,6 гр
5. 26,7 x 19,2=4,7 гр

Средний размер яиц обыкновенный удод составлял 26,5 x 19 мм, а средний вес — 4,5 грамма.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

26 апреля 2019 года в дупле старого тутового дерева, расположенного на территории лагеря Мингчинор Шафирканского района Бухарской области, было обнаружено гнездо пары обыкновенный удод с 4 яйцами. Мы наблюдали, что яйца в гнезде были заняты канюком. Входом в гнездо было дупло дерева высотой 160 см от земли и диаметром 10 см. Было обнаружено, что небольшое количество травы использовалось в качестве строительного материала для гнезда из дополнительной подстилки. Я думаю, что это, вероятно, остатки какого-то птичьего гнезда с прошлого года. Когда интенсивность яйцекладки обыкновенный удод наблюдалась в течение 15 дней, она составляла 4-8 часов в первые 5 дней, 3-7 часов во вторые пять дней и 2-6 часов в третьи пять дней.

Размеры яиц обыкновенный удод оказались существенно отличными от размеров яиц предыдущего года. Размеры яиц скунса оказались следующими.

1. 27,0 x 19,0=5,0 гр
2. 27,0 x 18,8=5,0 гр
3. 27,0 x 19,0=4,8 гр
4. 26,6 x 18,9=4,7 гр

Средний размер яиц обыкновенный удод составил 26,9 x 18,9 = 4,9 г. Птица начала насиживать яйца с того дня, как было отложено первое яйцо. Поэтому размер птенцов, вылупившихся из яиц, был разным. Самец не оставался вдали от гнезда долго, пока самка насиживала яйца, и было замечено, что он время от времени входил и выходил из гнезда.



1-фото Upupa epops – обыкновенный удод

Первые птенцы вылупились из яиц обыкновенный удод через 15 дней. Однако, поскольку эта птица покрывала яйца с того дня, как было отложено первое яйцо, вылупление

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

птенцов заняло до 20 дней. Мы наблюдали, как самец скунса кормил первых вылупившихся птенцов. После вылупления птенцов оба пола кормили их вместе. Кормление птенцов длилось от 23 до 26 дней. В течение первой недели они кормили молодых птенцов мягкими насекомыми и их личинками, такими как мухи, муравьи, термиты и мокрицы. В течение второй недели кормления мы наблюдали, как самец обыкновенный удод кормил птенцов мелкими беспозвоночными (например, сороконожками, дождевыми червями, щитовками, майскими жуками, щитовками, стрекозами и мелкой рыбой). К третьей неделе кормления птенцов кормили насекомыми, включая капустниц, стрекоз, пчел, божьих коровок, золотистых жуков, кузнечиков, желтых ос, пауков-кругопрядов, фаланг, мелких моллюсков и различных жуков. Самец обыкновенный удод кормил самку скунса 7-12 раз, пока она откладывала яйца. Птенцы , несмотря на то, что они очень хрупкие и слабые, очень активны. Их вес был следующим:

1. Вес цыпленка 4,6 гр
2. Вес цыпленка 4,7 гр
3. Вес цыпленка 4,4 гр
4. Вес цыпленка 4,2 гр

Средний вес птенцов, вылупившихся из яиц, составил 4,5 г. Птенцы обыкновенный удод не были покрыты эмбриональным пухом на спине. Ушные отверстия у птенцов обыкновенный удод, вылупившихся из яиц, открылись в возрасте 6 дней, а на 8-й день наблюдался рост крыльевых и рулевых перьев, а глаза открылись на 7-й и 8-й день. Птенцы обыкновенный удод начали летать и развивать рулевые перья на 10-й день, а на 12-й день мы наблюдали появление белых пятен на кончиках первостепенных и второстепенных маховых перьев.

Птенцы обыкновенный удод готовы к полету на 25-й день, и их масса была определена следующим образом. Несмотря на то, что они хрупкие и слабые, они очень активны. Их вес был следующим.

1. Вес цыпленка 42,0 gr
2. Вес цыпленка 44,5 gr
3. Вес цыпленка 45,0 gr
4. Вес цыпленка 43,0 gr

Птенцы обыкновенный удод оперяются на 27-й день, в это время их средний вес составляет 44,0 грамма.

От вылупления до оперения птенцы выделяют маслянистую жидкость из копчиковой железы, которая имеет резкий, неприятный запах. Птенцы пытаются защитить себя от мелких наземных хищников, сбрасывая жидкость из копчиковой железы вместе с пометом, если кто-то их потревожит.

Мы наблюдали, как пара обыкновенный удодов кормила своих только что вылупившихся птенцов 25 мая 2023 года в районе Бозачи МФЮ Каровулбазарского района Бухарской области. 30 мая 2024 года мы наблюдали, как пара обыкновенный удодов кормила своих только что вылупившихся птенцов на плантации шелковицы в районе Янгихаёт МФЮ Кагонского района.

Обыкновенный удод впервые был зарегистрирован в Бухарской области 25 февраля 2025 года в MFY Бозачи Караулбазарского района. 3-5 марта 2025 года мы наблюдали 3 пары, летающие в MFY «Узбакон» и «Хайрихуш» Вобкентского района. 29-30 марта 2025 года мы наблюдали самца обыкновенный удода, идущего от 800 до 900 утром, демонстрирующего

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

различное предгнездовое поведение. Мы заметили, что он ходил громко, опускал клюв вниз и становился активным.



2-фото Upupa epops – Общий вид обыкновенный удод

Обыкновенный удод — чистоплотная птица, и он предпочитает жить в местах, которые чисты и свободны от различных токсичных химических газов и веществ. Когда он чувствует опасность, он поднимает свою корону на голове и опускает ее, когда он в безопасности. Если он чувствует опасность от врага для себя или своего потомства, он выделяет черную, дурно пахнущую жидкость из желез под хвостом. Поскольку у обыкновенный удода хорошее зрение, он может даже видеть воду издалека. Вот почему говорят, что у людей с острыми глазами «глаза острее, чем у человека».

Биоразнообразие является актуальным и потенциальным ресурсом для удовлетворения экономических, экологических и культурно-эстетических потребностей общества. Не секрет, что с ростом населения, освоением земель в хозяйственных целях и сокращением природных зон численность многих растений и животных уменьшается из-за сокращения их местообитаний.

По данным Международного союза охраны природы, этот вид птиц весьма многочислен. Несмотря на то, что общая численность птиц в последние годы сократилась, ее динамика в настоящее время не позволяет считать этот вид уязвимым. В Международной Красной книге он имеет статус таксона минимального риска. Однако мы считаем целесообразным в будущем

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

включить в «Красную книгу» Республики Узбекистан вид птиц **Обыкновенный удод**, численность которого сокращается.

Литературы

1. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской Федерации. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. — 256 с. — ISBN 5-87317-263-3.
2. Жизнь животных по А. Э. Брему: В 5 т. / Под ред. А. Н. Северцова. — М., 1937—1948.
3. Птицы Казахстана — Удод (Upupa epops). Дата обращения: 20 июня 2008. Архивировано из оригинала 24 сентября 2008 года.