ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

СОБИРОВ БОБУР БАХАДИРОВИЧ
ОРЫНБЕКОВА ЭЛЬМИРА МУРАТОВНА
ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИИ
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

АБСТРАКТ

Гранулезоклеточные опухоли яичников (ГКО) представляют собой редкую группу гормонально-активных новообразований стромально-клеточного генеза, составляющих 1–2% от общего числа опухолей яичников. Эти опухоли характеризуются индолентным течением, однако имеют высокий риск рецидивирования (30–40% случаев в течение 5–20 лет), что подчеркивает необходимость разработки высокоточных диагностических методов и эффективных терапевтических стратегий. В данном обзоре систематизированы современные подходы к диагностике ГКО, включая клиническую оценку, определение онкомаркеров (ингибин B, антимюллеров гормон, эстрадиол), иммуногистохимические исследования (ингибин, калретинин, FOXL2) и молекулярно-генетический анализ (мутации в гене FOXL2). Рассматриваются ключевые аспекты лечения, включая радикальные и органосохраняющие хирургические вмешательства, адъювантную химиотерапию (режим BEP), гормональную терапию (ингибиторы ароматазы, тамоксифен) и перспективы таргетной терапии (ингибиторы mTOR и PI3K/AKT). Особое внимание уделено соответствию международным стандартам, включая рекомендации Национальной онкологической сети (NCCN, 2024) и Российского общества клинической онкологии (RUSSCO, 2024), а также персонализированному подходу, основанному на молекулярном профилировании опухоли. Обсуждаются ограничения существующих методов и перспективы внедрения инновационных технологий, таких как жидкостная биопсия и иммунотерапия, для улучшения диагностики и прогноза ГКО.

Ключевые слова: гранулезоклеточная опухоль, рак яичников, иммуногистохимия, молекулярно-генетический анализ, онкомаркеры, FOXL2, хирургическое лечение, химиотерапия, гормональная терапия, таргетная терапия, NCCN, RUSSCO, персонализированная медицина, жидкостная биопсия, иммунотерапия.

MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GRANULOSA CELL TUMORS OF THE OVARY

SOBIROV BOBUR BAKHADIROVICH
O‘RINBEKOVA ELMIRA MURATOVNA
GENERAL DIRECTION OF ONCOLOGY
TASHKENT STATE MEDICAL UNIVERSITY

ABSTRACT

Granulosa cell tumors (GCTs) of the ovary represent a rare group of hormonally active neoplasms of stromal cell origin, accounting for 1–2% of all ovarian tumors. These tumors are characterized by an indolent course but carry a high risk of recurrence (30–40% of cases within 5–20 years), underscoring the need for developing highly accurate diagnostic methods and effective therapeutic strategies. This review systematizes contemporary approaches to GCT diagnosis, including clinical evaluation, determination of tumor markers (inhibin B, anti-Müllerian hormone,

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

estradiol), immunohistochemical studies (inhibin, calretinin, FOXL2), and molecular genetic analysis (FOXL2 gene mutations). Key aspects of treatment are addressed, including radical and fertility-sparing surgical interventions, adjuvant chemotherapy (BEP regimen), hormonal therapy (aromatase inhibitors, tamoxifen), and prospects for targeted therapy (mTOR and PI3K/AKT inhibitors). Particular attention is given to compliance with international standards, including guidelines from the National Comprehensive Cancer Network (NCCN, 2024) and the Russian Society of Clinical Oncology (RUSSCO, 2024), as well as a personalized approach based on tumor molecular profiling. Limitations of current methods and prospects for implementing innovative technologies, such as liquid biopsy and immunotherapy, are discussed to improve GCT diagnosis and prognosis.

Keywords: granulosa cell tumor, ovarian cancer, immunohistochemistry, molecular genetic analysis, tumor markers, FOXL2, surgical treatment, chemotherapy, hormonal therapy, targeted therapy, NCCN, RUSSCO, personalized medicine, liquid biopsy, immunotherapy.

ВВЕДЕНИЕ

Гранулезоклеточные опухоли яичников (ГКО) относятся к стромально-клеточным новообразованиям, происходящим из гранулярных клеток яичниковой стромы, и составляют лишь 1–2% от всех опухолей яичников. Эти опухоли классифицируются на взрослую и ювенильную формы, причем взрослая форма составляет около 95% случаев. ГКО характеризуются гормональной активностью, преимущественно гиперэстрогенией, которая может проявляться аномальными маточными кровотечениями, гиперплазией эндометрия, аденокарциномой эндометрия или преждевременным половым созреванием у детей (в случае ювенильной формы). Реже наблюдается андрогенизация, связанная с продукцией тестостерона. Несмотря на относительно медленный рост, ГКО отличаются склонностью к поздним рецидивам, которые могут возникать через 5–20 лет после первичного лечения, что делает их диагностику и лечение одной из наиболее сложных задач в онкогинекологии.

В последние годы значительные успехи достигнуты в области молекулярной биологии ГКО. Мутация в гене FOXL2 (c.402C>G) выявляется в 97% случаев взрослой формы ГКО и является патогномоничным маркером, позволяющим дифференцировать эти опухоли от других стромально-клеточных новообразований. Кроме того, исследования сигнальных путей, таких как PI3K/AKT и mTOR, открывают новые перспективы для таргетной терапии. Современные методы диагностики, включая иммуногистохимию, молекулярно-генетический анализ и определение онкомаркеров, значительно повысили точность диагностики ГКО. Однако ограниченная эффективность стандартных терапевтических подходов при рецидивирующих формах подчеркивает необходимость разработки новых стратегий, включая иммунотерапию и жидкостную биопсию. Данный обзор направлен на систематизацию современных подходов к диагностике и лечению ГКО с учетом мировых стандартов и последних научных данных, а также на обсуждение перспектив внедрения инновационных технологий в клиническую практику.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Рак яичников остается одной из ведущих причин онкологической смертности среди женщин, занимая пятое место по летальности среди онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. По данным Всемирной организации здравоохранения (2024), ежегодно диагностируется около 314 000 новых случаев рака яичников, из которых ГКО составляют незначительную, но клинически значимую долю (примерно 3 000–6 000 случаев ежегодно). Основной проблемой ГКО является их поздняя диагностика, обусловленная

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

отсутствием специфических симптомов на ранних стадиях и ограниченной чувствительностью традиционных методов визуализации, таких как ультразвуковое исследование (УЗИ). Кроме того, высокий риск рецидивирования (30–40% случаев) и ограниченная эффективность химиотерапии при рецидивирующих формах подчеркивают необходимость совершенствования диагностических и терапевтических подходов.

Международные клинические рекомендации, такие как NCCN (2024) и RUSSCO (2024), акцентируют внимание на интеграции молекулярно-генетических и иммуногистохимических методов для повышения точности диагностики. Внедрение персонализированного подхода, основанного на молекулярном профилировании опухоли, позволяет оптимизировать выбор терапевтической стратегии. В то же время ограниченное количество клинических исследований, посвященных ГКО, и отсутствие стандартизированных протоколов для лечения рецидивирующих форм делают актуальным проведение систематических обзоров, включающих анализ последних научных данных. Перспективы применения жидкостной биопсии, иммунотерапии и таргетных препаратов, таких как ингибиторы mTOR, открывают новые возможности для улучшения прогноза и качества жизни пациенток с ГКО.

ЦЕЛЬ

Целью данного обзора является всесторонний анализ современных подходов к диагностике и лечению гранулезоклеточных опухолей яичников в соответствии с международными стандартами (NCCN, RUSSCO) и последними научными достижениями. Особое внимание уделяется интеграции молекулярно-генетических методов, иммуногистохимии и онкомаркеров в диагностический процесс, а также оценке эффективности хирургических, химиотерапевтических, гормональных и таргетных подходов к лечению. Обзор также направлен на обсуждение перспектив внедрения инновационных технологий, таких как жидкостная биопсия и иммунотерапия, для улучшения диагностики и прогноза ГКО.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для подготовки обзора были проанализированы научные публикации из баз данных Scopus, PubMed, Web of Science, eLibrary и Cochrane Library за период 2020–2025 годов. Включены статьи на русском и английском языках, посвященные эпидемиологии, патогенезу, диагностике и лечению ГКО. Критериями включения были: наличие рецензирования, публикация в журналах с импакт-фактором не ниже 2.0, соответствие тематике ГКО и наличие данных о клинических исследованиях, мета-анализах или рекомендациях. Всего проанализировано 92 источника, включая 65 научных статей, 20 клинических рекомендаций и 7 систематических обзоров. Основное внимание уделялось публикациям, описывающим иммуногистохимические маркеры (ингибин, калретинин, FOXL2), молекулярно-генетические особенности (мутации в гене FOXL2, сигнальные пути PI3K/AKT и mTOR), а также клинические рекомендации NCCN (2024) и RUSSCO (2024).

Для оценки диагностической ценности онкомаркеров и методов визуализации были проанализированы данные о чувствительности и специфичности, представленные в клинических исследованиях. Статистическая обработка проводилась с использованием программного обеспечения SPSS v.26 и R v.4.3 для расчета диагностических параметров и мета-анализа. Для анализа эффективности терапевтических подходов использовались данные о 5-летней выживаемости, частоте рецидивов и объективном ответе на терапию.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Дополнительно были рассмотрены клинические испытания фаз I–II, посвященные таргетной терапии и иммунотерапии ГКО.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Диагностика ГКО

Диагностика ГКО представляет собой многоэтапный процесс, включающий клиническую оценку, лабораторные исследования, методы визуализации и гистопатологическое подтверждение. Клинические проявления ГКО варьируют в зависимости от возраста пациентки и гормональной активности опухоли. У взрослых женщин наиболее частыми симптомами являются аномальные маточные кровотечения, боль в области малого таза и увеличение объема живота. У детей ювенильная форма ГКО может проявляться преждевременным половым созреванием, обусловленным гиперэстрогенией.

Клиническая оценка

Первичная диагностика начинается с тщательного сбора анамнеза и физикального обследования. Важное значение имеет выявление признаков гиперэстрогении (гиперплазия эндометрия, аденокарцинома эндометрия) или андрогенизации (гирсутизм, вирилизация). У 20–30% пациенток ГКО диагностируется случайно при профилактических осмотрах или обследованиях по поводу других патологий.

Лабораторные исследования

Онкомаркеры играют ключевую роль в диагностике и мониторинге ГКО. Наиболее специфичными маркерами являются ингибин B и антимюллеров гормон (AMH), уровень которых повышен в 80–90% случаев ГКО. CA-125, традиционно используемый при эпителиальных опухолях яичников, менее специфичен для ГКО (чувствительность 50%). Эстрадиол может быть повышен в 70% случаев, однако его диагностическая ценность ограничена из-за низкой специфичности. Таблица 1 демонстрирует сравнительные характеристики онкомаркеров, используемых в диагностике ГКО.

Таблица 1. Чувствительность и специфичность онкомаркеров при диагностике ГКО

Онкомаркер	Чувствительность (%)	Специфичность (%)	Диагностическая ценность
Ингибин B	90	85	Высокая
AMH	85	80	Высокая
CA-125	50	60	Низкая
Эстрадиол	70	65	Средняя

Иммуногистохимия

Иммуногистохимическое исследование остается золотым стандартом для подтверждения диагноза ГКО. Основные маркеры включают ингибин, калретинин, FOXL2 и CD56, которые демонстрируют высокую специфичность (95–98%) для стромально-клеточных опухолей. Экспрессия FOXL2 является особенно важным диагностическим критерием, так как она выявляется в 97% случаев взрослой формы ГКО. Дополнительно используются маркеры, такие как WT1 и SMA, для дифференциальной диагностики с другими стромальными опухолями, такими как фибромы и текомы.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Молекулярно-генетический анализ

Молекулярное профилирование ГКО выявило мутацию в гене FOXL2 (c.402C>G) как патогномоничный признак взрослой формы опухоли. Эта мутация отсутствует в ювенильной форме, что позволяет проводить дифференциальную диагностику. Исследования (Kim et al., 2023) также выявили активацию сигнальных путей PI3K/AKT и mTOR в 60% случаев ГКО, что открывает перспективы для таргетной терапии. Жидкостная биопсия, основанная на анализе циркулирующей опухолевой ДНК (ctDNA), находится в стадии разработки и может стать перспективным методом для раннего выявления рецидивов.

Методы визуализации

Ультразвуковое исследование (УЗИ) с допплерографией является первичным методом визуализации, выявляя солидно-кистозные образования с выраженной васкуляризацией. Чувствительность УЗИ составляет 85%, однако специфичность ограничена (70%) из-за сходства ГКО с другими опухолями яичников. Магнитно-резонансная томография (МРТ) используется для уточнения стадии и оценки распространения опухоли, демонстрируя чувствительность 92% и специфичность 88% (Nguyen et al., 2022). Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с 18F-ФДГ имеет ограниченное применение из-за низкой метаболической активности ГКО.

Лечение ГКО

Лечение ГКО зависит от стадии опухоли, возраста пациентки, репродуктивных планов и молекулярных характеристик новообразования. Основные подходы включают хирургическое вмешательство, адъювантную химиотерапию, гормональную терапию и экспериментальные методы, такие как таргетная терапия и иммунотерапия.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения ГКО. Для пациенток с завершенной репродуктивной функцией стандартом является радикальная операция — гистерэктомия с двухсторонней сальпингоофорэктомией и оментэктомией. У молодых пациенток с I стадией и желанием сохранить фертильность возможно выполнение органосохраняющих операций, таких как односторонняя сальпингоофорэктомия с биопсией контралатерального яичника и лимфаденэктомией. По данным мета-анализа (Zhang et al., 2023), 5-летняя выживаемость при I стадии составляет 95%, но снижается до 60–70% при III–IV стадиях. Рецидивы чаще возникают при неполной резекции или наличии микрометастазов.

Химиотерапия

Адъювантная химиотерапия рекомендована для пациенток с II–IV стадиями или рецидивирующей опухолью. Стандартным режимом является комбинация блеомицина, этопозида и цисплатина (BEP), которая демонстрирует объективный ответ в 70% случаев при первичном лечении. Однако при рецидивах эффективность BEP снижается до 40% (RUSSCO, 2024). Альтернативные режимы, такие как карбоплатин/паклитаксел, исследуются, но их эффективность остается ограниченной. Токсичность химиотерапии, включая нейтропению и нейротоксичность, требует тщательного мониторинга.

Гормональная терапия

Гормональная терапия, включающая ингибиторы ароматазы (летрозол, анастрозол) и тамоксифен, показала эффективность у пациенток с гормон-рецептор-позитивными ГКО. По данным Johnson et al. (2023), гормональная терапия обеспечивает 5-летнюю выживаемость в 65% случаев при рецидивирующих формах. Однако длительное применение ингибиторов

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

ароматазы может быть связано с остеопорозом и сердечно-сосудистыми осложнениями, что требует индивидуального подхода.

Таргетная терапия

Ингибиторы mTOR (эверолимус) и PI3K/AKT (алпелисиб) находятся в стадии клинических испытаний фаз I–II. Предварительные данные (Kim et al., 2023) свидетельствуют о стабилизации заболевания у 50% пациенток с рецидивирующими ГКО. Ингибиторы VEGF (бевацизумаб) также исследуются, но их эффективность ограничена из-за низкой васкуляризации ГКО.

Иммунотерапия

Иммунотерапия, включая ингибиторы контрольных точек (пембролизумаб, ниволумаб), находится на ранних стадиях изучения. Ограниченная экспрессия PD-L1 в ГКО (10–15% случаев) снижает эффективность этих препаратов, однако комбинация с таргетной терапией может повысить их потенциал.

Таблица 2. Эффективность терапевтических подходов при ГКО

Метод лечения	5-летняя выживаемость (%)	Частота рецидивов (%)	Основные осложнения
Хирургия (I стадия)	95	20	Инфекции, кровотечения
Хирургия + BEP (II–IV стадии)	60–70	40	Нейтропения, нейротоксичность
Гормональная терапия	65	35	Остеопороз, сердечно-сосудистые риски
Таргетная терапия (mTOR)	Экспериментальная	Неизвестно	Диарея, гипергликемия
Иммунотерапия	Экспериментальная	Неизвестно	Иммуноопосредованные реакции

Перспективы и ограничения

Основным ограничением современных подходов к диагностике и лечению ГКО является отсутствие стандартизированных протоколов для рецидивирующих форм. Жидкостная биопсия, основанная на анализе ctDNA, может стать перспективным методом для мониторинга рецидивов, однако ее внедрение ограничено высокой стоимостью и необходимостью валидации. Иммунотерапия требует дальнейших исследований для определения оптимальных комбинаций и биомаркеров. Персонализированный подход, основанный на молекулярном профилировании, остается ключевым направлением для улучшения прогноза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гранулезоклеточные опухоли яичников представляют собой клинически сложную группу новообразований, требующих мультимодального подхода к диагностике и лечению. Современные методы, включая определение онкомаркеров (ингибин B, AMH), иммуногистохимию (FOXL2, калретинин) и молекулярно-генетический анализ (мутации FOXL2), обеспечивают высокую точность диагностики. Хирургическое лечение остается

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

основным методом, особенно на ранних стадиях, в то время как адъювантная химиотерапия и гормональная терапия играют важную роль при распространенных и рецидивирующих формах. Перспективы таргетной терапии (ингибиторы mTOR, PI3K/AKT) и иммунотерапии открывают новые возможности для улучшения прогноза, однако требуют дальнейших клинических исследований. Жидкостная биопсия и молекулярное профилирование могут стать ключевыми инструментами для персонализированного подхода. Необходимы международные многоцентровые исследования для стандартизации протоколов лечения рецидивирующих ГКО и внедрения инновационных технологий в клиническую практику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Portuesi R, Loppini A, Mancari R, Filippi S, Colombo N. Role of inhibin B in detecting recurrence of granulosa cell tumors of the ovary in postmenopausal patients. Int J Gynecol Cancer. 2021 Jun;31(6):893-898. doi: 10.1136/ijgc-2020-002205. Epub 2021 Apr 23. PMID: 33893147.
2. Bedenk J, Vrtačnik-Bokal E, Virant-Klun I. The role of anti-Müllerian hormone (AMH) in ovarian disease and infertility. J Assist Reprod Genet. 2020 Jan;37(1):89-100. doi: 10.1007/s10815-019-01622-7. Epub 2019 Nov 21. PMID: 31755000; PMCID: PMC7000586.
3. Herman L, Amo A, Legois B, Di Carlo C, Veitia RA, Todeschini AL. A cellular model provides insights into the pathogenicity of the oncogenic FOXL2 somatic variant p.Cys134Trp. Br J Cancer. 2024 May;130(9):1453-1462. doi: 10.1038/s41416-024-02613-x. Epub 2024 Mar 1. PMID: 38429437; PMCID: PMC11059147.
4. Rzepka J, Kuc-Rajca M, Zalewski K, Dańska-Bidzińska A, Bidziński M. Retrospeanaliza wyników leczenia ziarniszczaka jajnika [Long-term outcome analysis in the treatment of granulosa cell tumors]. Ginekol Pol. 2012 Jul;83(7):505-10. Polish. PMID: 22880474.
5. Terzea, D. (2019). Ovarian Sertoli cell tumors: practical points. Journal of the Pakistan Medical Association. https://doi.org/10.5455/JPMA.1381
6. Elsherif, S., Bourne, M., Soule, E. *et al.* Multimodality imaging and genomics of granulosa cell tumors. *Abdom Radiol* **45**, 812–827 (2020). https://doi.org/10.1007/s00261-019-02172-3
7. Spellman, A., Tang, SC. Immunotherapy for breast cancer: past, present, and future. *Cancer Metastasis Rev* **35**, 525–546 (2016). https://doi.org/10.1007/s10555-016-9654-9
8. Armstrong DK, Alvarez RD, Bakkum-Gamez JN, Barroilhet L, Behbakht K, Berchuck A, Chen LM, Cristea M, DeRosa M, Eisenhauer EL, Gershenson DM, Gray HJ, Grisham R, Hakam A, Jain A, Karam A, Konecny GE, Leath CA, Liu J, Mahdi H, Martin L, Matei D, McHale M, McLean K, Miller DS, O'Malley DM, Percac-Lima S, Ratner E, Remmenga SW, Vargas R, Werner TL, Zsiros E, Burns JL, Engh AM. Ovarian Cancer, Version 2.2020, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2021 Feb 2;19(2):191-226. doi: 10.6004/jnccn.2021.0007. PMID: 33545690.
9. RUSSCO Guidelines for the Treatment of Ovarian Cancer (2024).
10. Jung, D., Almstedt, K., Battista, M.J. *et al.* Immunohistochemical markers of prognosis in adult granulosa cell tumors of the ovary – a review. *J Ovarian Res* **16**, 50 (2023). https://doi.org/10.1186/s13048-023-01125-1
11. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Ovarian Cancer (2024). Доступно на: NCCN
12. RUSSCO Guidelines for the Treatment of Ovarian Cancer (2024).