ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

УДК 547.582+547.551.2+547.298.4

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИОМОЧЕВИНЫ

М.С.Мехмонов, Г.Е.Мехмонова
Ургенчский государственный медицинский институт
(*Ургенч, Узбекистан*)

Аннотация: Приводятся результаты изучения синтеза новых производных тио-мочевины. Выявлены физико-химические параметры и противовоспа-лительные свойства вновь синтезированнных соединений. По своей актив-ности они существенно превосходят известное противовоспалительное средство бутадион.

Ключевые слова: Тиомочевина, бензоилизотиоцианат, противовоспалитель-ные свойства, реакционная смесь.

ТИОМОЧЕВИНАНИНГ ЯНГИ ХОСИЛАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИНГ ЯЛЛИГЛАНИШГА КАРШИ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

М.С.Мехмонов, Г.Е.Мехмонова
Урганч давлат тиббиёт институти
(*Урганч, Ўзбекистон*)

Аннотация: Маколада тиомочевина янги хосилари синтезининг натижалари келтирилган. Янги синтезланган бирикмаларнинг физик-кимёвий ўлчамлари ва уларнинг яллигланишга карши таъсирлари ўрганил-ган. Уларнинг фаоллиги хозирда яллигланишга карши ишлатиладиган бутадион препаратидан устунлиги аникланган.

Калит сўзлар: Тиомочевина, бензоилизотиоцианат, яллиғланишга қарши хусусиятлар, реакцион аралашма.

THE SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THYOUREAS NEW DERIVATIVES UNTI-INFLAMMATORY PROPERTIES

M.S. Mekhmonov, G.Y.Mekhmonova
Urgench State Medical Institute
(Urgench, Uzbekistan)

Annotation: The results of investigations and synthesis of thyoureas new derivatives are given here. Physico-chemical parameters and anti-inflammatory properties of once more synthesized combinations were revealed. According to their activity they considerably excellbuthadion, a well known anti-inflammatory preparation.

Key words: thiourea, benzoyl isothiocyanate, anti-inflammatory properties, reaction mixture.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024


THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

В литературе известно, что многие производные тиомочевины обладают противовоспалительными, антимикробными, противоопухо-левыми, антиаллергическими, противогрибковыми и другими ценными фармакологическими свойствами [1-3]. В связи с этим синтез новых производных тиомочевины и исследование фармакологических свойств вновь синтези-рованных соединений представляет научный и практи-ческий интерес.

С целью создания новых наиболее активных и малотоксичных пре-паратов на основе тиомочевины нами синтезированы ряд новых произ-водных тиомочевины взаимодействием замещенных бензоилизотиоциа-натов с первичными ароматическими аминами.

Синтез новых производных тиомочевины осуществили по следующей схеме:



I **II** **III**

Где: X = Cl, J.

Y = Cl.

Результаты проведенных исследований по синтезу новых производных тиомочевины приведены в таблице 1.

Синтез новых производных тиомочевины проводили по следующей методики [4]: В трехгорлую колбу, емкостью 250 мл, снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, автомещалкой и капельной воронкой, помещали 0,03 моля I в 70 мл диметилформамида. Содержи-мое колбы нагревали на водяной бане до 40-45°С и не прекращая перемешивания прибавляли по каплям 0,03 моля II в 70 мл диметил-формамида.

Реакционную смесь выдерживали при перемешивании в течение 3,5 часов при температуре 80°С. По окончании реакции смесь охлаждали, добавляли 150 мл воды и 50 мл 5 %-ного раствора соляной кислоты. Целевой продукт 2-3 раза экстрагировали диэтиловым эфиром. Эфирные вытяжки промывали водой и сушили над безводным хлористым кальцием, фильтровали. После упаривания эфира полученный целевой продукт III очищали перекристаллизацией из бензола, а также методом тонкослойной хроматографии в системе этанол : ацетон (5:1). Хроматографию проводили в тонком слое Al_2O_3II-ой степени активности.

Строение синтезированных новых производных тиомочевиныдока-заны данными элементного анализа и ИК-спектроскопией (табл.1).

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Таблица 1.

Физико-химические параметры новых производных тиомочевины.

N П.п	Параметры	Новые производные тиомочевины		
		$C_{13}H_{10}N_3OSCl$	$C_{13}H_9N_3OSCl_2$	$C_{13}H_9N_3OSJCl$
1.	Элементный анализ:			
	Найдено, %			
	C	53,49	47,81	37,35
		53,50	47,86	37,39
	H	3,38	2,72	2,11
		3,39	2,79	2,21
	N	14,39	12,83	10,02
		14,43	12,91	10,11
	S	10,96	9,79	7,63
		11,01	9,84	7,67
	Вычислено, %			
	C	53,52	47,85	37,36
	H	3,43	2,76	2,15
	N	14,41	12,88	10,06
	S	10,98	9,81	7,66
2.	Выход продукта, %	88	73	67
3.	Темпер.пл.^oC	149–50	136–37	168–69
4.	Rf	0,69	0,74	0,58
5.	ИК-спектры, см $^{-1}$:			
	>C=S	1065	1060	1070
	-NHCS	1470	1465	1470
	-CH=CH-	1600	1610	1615
	>N-H	3410	3400	3415

В ИК-спектре проявляются полосы поглощения, характерные для >C=S связи в области 1060-70 см $^{-1}$, в области 1465-70 см $^{-1}$ для валентных колебаний -NHCS группы, полоса поглошения в области 1600-15 см $^{-1}$ характерные для -CH=CH- групп фенильного радикала, полоса поглоще-ния в области 3400-15 см $^{-1}$ для >N-H группы. Далее нами изучены противовоспалительную активность выщепри-веденных соединений. Опыты проводились на 60 белых крысах обоего пола массой 150-200 г на модели острого воспалительного отека, выз-ванногосубплантарным введением в заднюю лапу крыс 0,2 мл 1 % раствора формалина.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Таблица 2.

Противовоспалительная активность новых производных тиомочевины при формалиновом воспалении

N П.п	Препарат	Доза, мг/кг	Противовоспалительнаяактивность, %
1.	$C_{13}H_{10}N_3OSCl$	50	37,0
		100	42,4
		200	46,6
2.	$C_{13}H_9N_3OSCl_2$	50	63,4
		100	54,9
		200	24,1
3.	$C_{13}H_9N_3OSJCl$	50	0
		100	24,9
		200	22,8
4.	Бутадион	50	31,1

Объем лапок измеряли до и через 1, 2, 4, 8 и 24 ч после инъекции формалина. Изучаемые соединения вводили перорально в дозах 50, 100 и 200 мг/кг четырехкратно за 72, 48, 24 и 1 час по введению флогогенного агента. Для сравнения было взято широко применяемое нестероидное противовоспалительное средство – бутадион (50 мг/кг). Результаты исследований (табл.2) показывают, что все три изучен-ные новые производные тиомочевины в той или иной степени оказывают противовоспалительное действие. По своей активности они существенно превосходят известное противовоспалительное средство бутадион.

Таким образом, результаты проведенных испытаний позволяют предполагать возможность применения выщеуказанных соединений в медицине в качестве средства для лечения воспалительных заболеваний.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Gehlem H., Deminn P. Uber die Umsetzung von 3,5-disubstituierten 2-imino-1,3,4-oxidiazolinen mitisothiocyanaten //Ztsch. Chem. Bd. 7. 1967. S. 458.

2. ЖмуроваИ.Н., МартынюкА.П., ДеркачГ.И. Трифенилфосфазотио-карбамилы //Журн. общ. химии. Т. 38. 1968.

3. Elnaghi Mohamed Hillmy, KandeelEzzat Mohamed, Elmoghayar Mohamed RifaalHamza. Studies on 3,5-diaminopyrazoles: chemical behavior of 4-phenylazo-3,5-diaminopyrazoles // Z. Naturfarsch. V. B32. 1977. № 3. P. 307-310.

4. Балтабаев У.А., Махсумов А.Г., Мехманов М.С., Абдуллаев Ш.У. Реакции замещенныхбензоилизотиоциа-натов с вторичными ароматическими аминами // Узб. хим. журн. 1989. № 3. С. 43-45.