ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

БИРЛАМЧИ ЁПИҚ БУРЧАКЛИ ГЛАУКОМАНИНГ ГЕНЕТИК БЕЛГИЛАРИНИ АНИҚЛАШ.

Андижон давлат тиббиёт институти
Хошимова Д.Х., Назаров Б.М.

Аннотация. Ушбу илмий мақолада бирламчи ёпиқ бурчакли глаукомани генетик жиҳатдан гетероген гуруҳи эканлиги, кўриш майдонининг қайтарилмас нуқсонларини келтириб чиқариши кўрсатиб ўтилган. Глаукома ҳам моноген, ҳам мураккаб касаллик сифатида наслдан-наслга мерос бўлиб ўтади, бу кўпинча кўз ичи босимининг ошиши (КИБ), трабекуляр тармоқ ва кўзнинг олд камерасидаги нуқсонлар билан боғлиқ бўлиб, кўз ичи суюқлигининг чиқиши бузилишига, кўрув нервининг прогрессив дегенерациясига олиб келади. Бироқ, КИБнинг кўтарилиши касалликнинг бошланиши ёки ривожланиши учун зарур ва етарли эмас. Мақолада ёпиқ бурчакли глаукоманинг генетикаси бўйича мавжуд маълумотлар қисман келтирилган.

Калит сўзлар: БЁБГ, генетика, БГА, БГБА, ўткир глаукома ҳужуми.

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПЕРВИЧНОЙ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ.

Андижанский государственный медицинский институт
Хошимова Д.Х., Назаров Б.М.

Аннотация. В этой научной статье показано, что первичная закрытоугольная глаукома представляет собой генетически гетерогенную группу заболеваний, вызывающих необратимые дефекты полей зрения. Глаукома передается по наследству из поколения в поколение как моногенное, так и комплексное заболевание, часто связанное с повышенным внутриглазным давлением (киб), трабекулярной сетью и дефектами передней камеры глаза, приводящими к нарушению оттока внутриглазной жидкости, прогрессирующей дегенерации зрительного нерва. Однако увеличение KIB является необходимым и недостаточным для возникновения или развития заболевания. В статье частично перечислены доступные данные о генетике закрытоугольной глаукомы. Ключевые слова: ПЗУГ, генетика, БГА, БГБА, острый приступ глаукомы.

IDENTIFICATION OF GENETIC SIGNS OF PRIMARY ANGLE-CLOSURE GLAUCOMA.

Andijan State Medical Institute
Xoshimova D.X. Nazarov B.M.

Annotation. This scientific article shows that primary angle-closure glaucoma is a genetically heterogeneous group of diseases that cause irreversible defects in the visual fields. Glaucoma is inherited from generation to generation as a monogenic and complex disease, often associated with increased intraocular pressure (ib), trabecular meshwork and defects in the anterior chamber of the eye, leading to impaired outflow of intraocular fluid, progressive degeneration of the optic nerve. However, an increase in KIB is necessary and insufficient for the onset or development of the disease. The article partially lists the available data on the genetics of angle-closure glaucoma.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Key words: CDG, genetics, acute attack of glaucoma

Бирламчи ёпиқ бурчакли глаукома – офтальмологиядаги улкан техник ютуқларга қарамай, даволаб бўлмайдиган ва оғир асоратли касаллик бўлиб қолмоқда. Уни тўлиқ даволаб натижа олиш мумкин эмас, лекин уни олдини олиш мумкин! **6 март куни.** Бу кун " Бутунжаҳон глаукома куни " деб бутун дунёда нишонланади. Ушбу кун 2008 йилдан бери Бутунжаҳон глаукома жамиятлари ассоциацияси (БГА) ва Бутунжаҳон глаукома беморлари ассоциацияси (БГБА) ташаббуси билан нишонланиб келинмоқда. Бутунжаҳон глаукома кунининг асосий мақсадларидан бири бу муаммо ҳақида аҳолининг хабардорлигини оширишдир, чунки касаллик тарқалишига қарамай, ахолининг фақат кичик бир қисми касаллик белгилари билан таниш ва ўз вақтида тиббий ёрдамга мурожаат қилишади.

Муаммонинг долзарблиги. Замонавий диагностика имкониятларига қарамай, глаукомани аниқлаш, янгиликларни излаш ва ёпиқ бурчакли глаукома ва глаукомани ўткир хуружига мойилликнинг аллақачон маълум бўлган генетик белгиларини аниқлаш масалалари долзарб бўлиб қолмоқда. Генетик полиморфизмлар ва бошқа биомаркерларни индивидуал кўриб чиқиш, шубҳасиз, БЁБГ диагностикаси ва даволаш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Глаукома оптик нейропатияларнинг генетик жиҳатдан гетероген гуруҳи бўлиб, улар кўриш майдонининг қайтарилмас нуқсонларини келтириб чиқаради ва йилига 60 миллион кишига таъсир қилади [26]. Глаукома ҳам моноген, ҳам мураккаб касаллик сифатида наслдан-наслга мерос бўлиб ўтади, бу кўпинча кўз ичи босимининг ошиши (КИБ), трабекуляр тармоқ ва кўзнинг олд камерасидаги нуқсонлар билан боғлиқ бўлиб, кўз ичи суюқлигининг чиқиши бузилишига, кўрув нервининг прогрессив дегенерациясига олиб келади. Бироқ, КИБнинг кўтарилиши касалликнинг бошланиши ёки ривожланиши учун зарур ва етарли эмас. Глаукоматоз дегенерацияда КИБ да мустақил механизмлар ҳам иштирок этади.

Тадқиқот мақсади ва вазифаси. Бирламчи ёпиқ бурчакли глаукомада клиник ва генетик тадқиқотлар ўтказиш, глаукомада иммунитет ва гемостаз бузилишларини ўрганиш, ёпиқ бурчакли глаукома билан оғриган беморларда автоном нерв тизимининг бузилишларини ўрганиш ва олдинги камера бурчагининг бирламчи аппозицион ёпилиши бўлган беморларда глаукома хуружларига мойиллигини аниқлаш.

Генетик омил. Замонавий диагностика имкониятларига қарамай, глаукомани аниқлаш, янгиликларни излаш ва ёпиқ бурчакли глаукома ва глаукоманинг ўткир ҳуружига мойилликнинг аллақачон маълум бўлган генетик белгиларини аниқлаш масалалари жуда долзарб бўлиб қолмоқда. Zhuang B. ва бошқ. (2018), Хитойнинг Миллий тадқиқот дастури rs3753841 в гене COL11A1 (collagen XI, alpha-1 polypeptide), rs1258267 в гене CHAT (Choline O-Acetyltransferase) ва rs736893 генида GLIS3 (GLI-KRUPPEL FAMILY MEMBER СОЛ3753841А11А1 генида (коллаген ХИ, алфа-1 полипептид), ЧАТ генида РС1258267 (холин О-Ацетилтрансфераза) ва ГЛИС736893 генида (ГЛИ-КРУППЕЛ оила аъзоси битта нуклеотид полиморфизмлари БЁБГ билан боғлиқлигини аниқлади. [37]. CHAT гени 10-хромосомада жойлашган ва холин ацетилтрансферазани кодлайди, бу ацетилхолин метаболизми орқали БЁБГ ривожланиш хавфига таъсир қилади деб ишонилади. GLIS3 гени оила тарихида рўйхатдан ўтган янги генетик тури бўлиб, етник келиб чиқиши ёпиқ бурчакли глаукоманинг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ. БЁБГга хос бўлган қатъий ирсий мутациялар ҳали аниқланмаганига қарамай, кўплаб тадқиқотлар унинг пайдо бўлиш хавфига ҳисса қўшадиган генетик омиллар мавжудлигини кўрсатади. СОЛ11А1 генининг БЁБГ ривожланишига

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

"қизиқиши" кўрсаткичлари бошқа тадқиқотларда ҳам учрайди. У склерал тўқималарда юқори даражада ифодаланган 12 турдаги коллагеннинг иккита алфа занжиридан бирини кодлайди. Коллаген синтезидаги ўзгаришлар склеранинг биомеханик ва қайта қуриш хусусиятларига таъсир қилади ва шу билан эксенел узунликнинг ўзгаришини ўз ичига олган глаукомага ва ушбу омил билан боғлиқ рефракция хатоларига олиб келиши мумкин. COЛ11A1 генидаги битта нуклеотид полиморфизми Япон ва Хитой тилларида миопия хавфи ортиши билан ҳам боғлиқлиги аниқланди [40]. Склеранинг коллаген таркибидаги фарқлар кўрув нерви бошининг субоптимал биомеханикаси билан ўзаро боғлиқ бўлиши мумкин, бу эса сезувчанликнинг ошишига ва кўрув нервининг аксонал шикастланишига олиб келиши мумкин [41]. Тайван (17576) ММП-9 ген (matrix protein киназ-9 ген) рс2013 ягона нуклеотид полиморфизм ўрганиш БЁБГ [42] ривожлантиришда бу ген "қизиқиш" тасдиқлади. ММП-9 гени ҳужайрадан ташқари матрицани қайта қуришда иштирок этадиган ферментни кодлайди ва бу ўз навбатида склеранинг биомеханик хусусиятларига ҳам таъсир қилади.БЁБГга хос бўлган қатъий ирсий мутациялар ҳали аниқланмаганига қарамай, БЁБГни генетик ва эпигенетик омилларнинг ўзаро таъсиридан келиб чиқадиган кўп факторли, генетик жиҳатдан аниқланган касаллик деб аташ мумкин. Генетик полиморфизмлар ва бошқа биомаркер ларни кўриб чиқиш касалликни ташхислаш ва даволаш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Бирламчи ёпиқ бурчакли глаукома кўришнинг бузилиши нуқтаи назаридан глаукоманинг оқибати жиҳатдан ноқулай шаклларидан биридир.

Бирламчи ёпиқ бурчакли глаукомани ривожланишидаги хавф омиллари.

- Ирсият ва ёши, асаб тизими.
- Артериал гипертония,Қандли диабет
- Мия томирлари ва орбитал артерияда қон айланишнинг бузилиши.
- Қон таркибий қисмини ўзгариши

Хулоса.

-Бирламчи ёпиқ бурчакли глаукомаси бўлган беморларнинг гемостаз тизимидаги бузилишлар қон зардобида айланма иммунитет комплекслари таркибининг кўпайиши билан боғлиқ .

-Оғир симпатикотония билан боғлиқ бўлган хороидал томирларда минтақавий қон оқимининг бузилиши глаукома хуружининг ривожланишига ёрдам беради.

-Рангдор паккрданинг қаттиқлигининг ошиши ва томир ичидаги агрегатларнинг шаклланиши, рангдор парданинг томирларида париетал тромбоз, тўқималарда фибрин шаклланиши билан тавсифланган маҳаллий тромбогеморрагик синдром глаукома хуружига ҳамроҳ бўлади.

-Минтақавий қон оқимининг бузилиши ламиина сереброза даражасида чуқур перипапилляр аро қон томир плексусида қон томир зичлигининг пасайиши билан тавсифланади, глаукома хуружи бўлган беморларда 33 ва 5,6% гача, аралаш глаукома билан оғриган беморларда 39 ва 5,7% гача. қарама-қарши кўзларга нисбатан бўлади.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Адабиётлар

1. Бакунина, Н.А. Роль иммунотерапии в купировании офтальмогипертензии / Н.А. Бакунина, Л.Н. Колесникова // Офтальмологические ведомости. – 2015. – № 3. – С. 72-81.

2. Гипотензивные режимы, обеспечивающие целевой уровень офтальмотонуса у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (результаты многоцентрового аналитического исследования) / Н.В. Волкова, П.Ч. Завадский, Н.А. Бакунина [и др.] // Национальный журнал глаукома –019. – Т. 18, № 4. – С. 244-59. – https://doi.org/10.25700/10.25700/NJG.2019.04.04.

3. Иммуно-гемостатические взаимосвязанные механизмы при первичной глаукоме преимущественно у пожилых пациентов. / Л.М. Балашова, Н.А. Бакунина, В.Л. Гришин, Г.В. Порядин, Ж.М. Салмаси // Клиническая геронтология. – 2021. – № 27 (1-2). – С. 37-45. – https://doi.org/10.26347/1607- 2499202101-02037-045