ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ

Юсупова Г.А., Исраилова Н.А., Мадаминова М.Ш.,Азимова Р.А.

АННОТАЦИЯ

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) является хроническим воспалительным заболеванием суставов у детей, характеризующимся аутоиммунным поражением соединительной ткани и системными проявлениями. Среди внесуставных поражений особое значение имеет вовлечение мочевыделительной системы, которое существенно влияет на течение, прогноз и тактику лечения заболевания.**Цельисследования:**изучить клинико-иммунологические изменения мочевыделительной системы у больных детей с ювенильным идиопатическим артритом. **Материалы и методы исследования:** Обследовано 80 пациентов в возрасте 4–17 лет. Всем больным проведено клинические, лабораторные и иммунологические исследования. **Результаты:** Поражение МВС выявлено у 66 (82,5%) детей, проявляющееся лейкоцитурией (79%), протеинурией (52%), гематурией (35%) и солями в моче (32%). Уровень IL-6 в сыворотке повышен в 5,8 раза, особенно при поли- и системных формах.

Ключевые слова: Ювенильный идиопатический артрит, мочевыделительная система, почки, иммунологические изменения.

Актуальность проблемы:Болезни суставов у детей являются актуальной проблемой педиатрии и ревматологии. Ювенильный идиопатический артрит - это часто встречаемое хроническое воспалительное заболевание суставов у детей, на развитие которого влияют различные факторы. Заболевание может поражать детей любого возраста, характеризуется длительным прогрессирующим течением, приводящим к развитию контрактур и потере функции суставов. ЮИА представляет собой системное хроническое заболевание соединительной ткани с преимущественно аутоиммунным патогенезом, длительностью более 6 недель, развивающееся у детей до 16 лет, характерным проявлением которого является артрит, при исключении другой патологии суставов. Патологический процесс приводит к деструкции поражённых суставов и сочетается у ряда больных с выраженными внесуставными проявлениями.Одним из наиболее значимых внесуставных проявлений при ЮИА является поражение мочевыделительной системы.[10,12, 13,14,20,21,28,30].Частота патологии мочевыделительной системы (МВС) при ЮИА составляет от 13 до 73%. По частоте поражения мочевыделительной системы ЮИА стоит на третьем месте среди ревматических, уступая лишь таким заболеваниям, как СКВ и СВ [28, 30].

Поражениемочевыделительной системы, при ревматоидном артрите (РА) занимает особое место среди других системных проявлений этого заболевания и оказывает значительное влияние на прогноз болезни, подходы к ее терапии и исход. По данным различных авторов [5,6,8,11,16,19,20,21,27] почечная патология встречается у 20-75% пациентов с данным заболеванием.

Изменения в почках характеризуются ранним появлением нестойкой лейкоцитурии и небольшой протеинурии и гематурии, которые чаще отмечаются в начале заболевания или при

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

его обострении и связаны с активностью и тяжестью РА, а также возрастом пациентов [7,8,9,17,21].

ЮИА является одним из основных заболеваний, приводящих к вторичному амилоидозу [18]. Частота его при РА у взрослых колеблется от 2% до 50% [3,12, 24], у детей встречается реже - в 3-15% и развивается преимущественно у больных системными формами в любом возрасте [1,22,29].

Ключевую роль в развитии РЗ играют процессы аутоиммунитета и аутовоспаления, связанные с генетически детерминированными и индуцированными факторами внешней среды дефектами активизации приобретенного и врожденного иммунного ответа [4,9,25,27,30]. При активном воспалении у детей с разными вариантами ЮИА характерным является вовлечение практически всех звеньев иммунной системы, активация клеточного и гуморального звена иммунитета [2,21,23,26]

Такие проявления системного действия ИЛ-6, как лихорадка и утренняя скованность, связаны с суточным ритмом секреции данного цитокина. ИЛ-6 стимулирует дифференцировку остеокластов, активирует их и усиливает резорбцию кости и, как следствие, способствует развитию генерализованного остеопороза, эрозивных изменений в суставах [1,17,30].

Состояние цитокиновой сети при различных вариантах ЮИА до конца не изучено. Некоторые авторы указывают на максимальное повышение ИЛ-6 при сЮА по сравнению с другими вариантами ЮИА. Выявлена взаимосвязь между уровнем провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 β, ИЛ-6), хемокинов (IP-10) и клинико-лабораторными показателями активности заболевания (СОЭ, СРБ, количество пораженных суставов) [1,17,24].

Таким образом, развитие хронического воспаления при РЗ опосредуется разнообразными нарушениями в системе иммунитета, активность воспаления коррелирует с изменениями синтеза широкого спектра иммунных медиаторов.

Цель исследования: изучить клинико-иммунологические изменения мочевыделительной системы у больных детей с ювенильным идиопатическим артритом.

Материалы и методы исследования: Обследовано80 больных детей с ЮИА, из них 54(67,5%)с суставной формой,13 (16,2 %) с полиартритическойформой,11(13,7%)больных детей с системной формой болезни.Из 80 больных 48 (60%) мальчиков и 32(40%) девочек в возрасте от 4 до 17 лет. Всем больным проводились стандартизированные клинические (сбор анамнеза жизни и болезни больного, оценка и динамика настоящего соматического статуса), лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, креатинин, мочевина, проба Ничипоренко), бактериологические (посев мочи) и ммунологическиеметоды исследования. Произведена оценка проявления дебюта заболевания: системный, полиартикулярный или олигоартикулярный характер. Оценено общее состояние больного и динамика клинических проявлений, рассмотрены данные о фармакологическом анамнезе (сведения о сопутствующей терапии базисными препаратами, предшествующем приеме других НПВС и спектре вызванных ими побочных реакций).

Результаты и обсуждение: Клинические проявления ЮИА у обследованных нами больных характеризовались значительным полиморфизмом симптомов. Анализ анамнеза показал, что первые клинические признаки заболевания появились за промежуток от 6месяцев до 2 лет до постановки диагноза болезни.В дебюте болезни у абсолютного большинства (87,3%) обследованных нами больных отмечалось ухудшение общего состояния: слабость, утренняя скованность, артралгии, похудание, субфебрильная лихорадка. У 13 наблюдаемых

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

нами больных отмечался персистирующий вариант олигоартрита, который характеризовался тем, что в течение всего периода заболевания поражались до 4 суставов. Прогрессирующий олигоартрит имел место у 28 обследованных больных и ему было свойственно увеличение числа пораженных суставов после 6 месяцев болезни. Установлены некоторые особенности суставного синдрома в зависимости от формы заболевания, характера течения ЮИА, пола и возраста больных. Так, суставная форма болезни с подострым началом сопровождалась развитием артрита с преимущественным поражением коленных и голеностопных суставов. В дальнейшем чаще других присоединялись лучезапястные и локтевые суставы. Суставно-висцеральная форма отмечалась у 11 обследованных нами больных и клинически характеризовалась высокой температурной реакцией, носящей интермиттирующий характер, не снижающийся при лечении антибиотиками. На фоне лихорадки у больных появлялась полиморфная сыпь ярко-розового цвета.

Среди обследованных нами детей с ЮИА, были выделены больные с поражением МВС в виде инфекций мочевых путей и нефритов. Проведен анализ частоты нефритов у больных с ЮИА, в ходе которого установлено, что мочевой синдром был выявлен у 46 детей из 80 проспективно наблюдаемых детей в возрасте 4-17 лет. Причем дети в период к началу наблюдения с поражением МВС были достоверно старше, чем в группе без поражения МВС ($p \leq 0,05$).

Активность поражения мочевыделительной системы у детей проявлялась протеинурией у 34больных, гематурией у 23 больных, лейкоцитурией у 52 больных. Соли в анализах мочи у 21 больного, выявлялись в виде оксалатурии у 16, триппельфосфатурии у 3 и уратурии у 2 больных (табл.1).

Таблица 1.

Основные лабораторные показатели активности поражения мочевыделительной системы у детей

Признаки	Поражение мочевыделительной системы, N = 66
Протеинурия	34
Микрогематурия	23
Лейкоцитурия	52
Оксалатурия	16
Триппельфосфатурия	3
Уратурия	2

Лабораторные исследования показали, что достоверно чаще у детей с поражением МВС при ЮИА по сравнению с детьми, не имевшими поражения МВС выявлялись анемия (2 и 3 степени у 12-х – 18,1% детей с поражением МВС и 3 - 3% без поражения), ускоренная СОЭ (40 мм/ч у 26 -39,3% пациентов с поражением МВС и у 6 - 17,6% без поражения). Отмечались также повышение уровня лейкоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, но без достоверных различий.Среди пациентов ЮИА с поражением МВС микроальбуминурия была выявлена у 14 пациентов (21,2%).

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

Активность поражения мочевыделительной системы у детей проявлялась изменениями в анализах мочи. Они проявлялись протеинурией у 34(52%) больных, гематурией у 23(35%) больных, лейкоцитурией у 52(79%) больных. Соли в анализах мочи обнаружены у 21(32%) больного, и выявлялись в виде оксалатурии у 16(24%), триппельфосфатурии у 3(5%) и уратурии у 2(3%) больных, смешанные изменения в моче у 22 (33%) больных.

Далее нами были изучены уровни креатинина сыворотки крови и скорость клубочковой фильтрации у данной категории больных по формуле Шварц (табл. 2).

Таблица 2.

Показатели функционального состояния почек по формуле Шварц.

Состояние почек	Дети с поражением МВС, N = 66
Функции почек сохранены, n=52	СКФ= 90-97 мл/мин/1,73м^2
Снижение клубочковой фильтрации, n=14	СКФ= 30-67 мл/мин/1,73м^2

Как видно из таблицы, у больных на момент проведения исследования отмечалось нарушение функции почек у большинства детей с ЮИА с поражением МВС.

Проведены иммунологические исследования провоспалительногоинтерлейкина (ИЛ-6/IL-6), при ЮИА у детей с целью выявить зависимость локальной продукции цитокинов от активности и тяжести заболевания, в данной работе проводили измерение цитокинов в сыворотке периферической крови у больных детей с ЮИА.

Выявлена уровень IL-6 был в 5,8 раза выше показателей контрольной группы и составил в среднем 47,28 ± 2,93 пг/мл (P<0,001), с размахом индивидуальных значений от 20,7 до 55,4 пг/мл. Значения выше среднего встречалось в 72,4% случаев. Уровень цитокина был более чем в 10 раз выше значений контрольной группы у больных детей с полиартикулярным и системным вариантами течения ЮИА, и составил в среднем 87,52 ± 7,41 пг/мл (P<0,001). Анализ данных показал, что у 20,0% больных был в пределах нижней границы индивидуальных значений, а у 30,0% выше средних значений.

Таким образом, проведенный анализ клинических вариантов и течения ювенильного идиопатического артрита свидетельствует об агрессивности и прогрессирующем характере течения заболевания, которая отражает современную возрастную эволюцию болезни, а также о поражении внутренних органов, особенно МВС, что диктует необходимость поиска эффективных методов лечения и предупреждение побочных действий лекарств на МВС.

Выводы: Лабораторные исследования показали, что достоверно чаще у детей с поражением МВС при ЮИА по сравнению с детьми, не имевшими поражения МВС, выявлялись анемия, ускоренная СОЭ, микроальбуминурия, увеличение креатинина и мочевины в биохимическом анализе крови.Увеличение числа болезненных и припухших суставов, повышение боли, экссудации, протеинурии, гематурии, что свидетельствует об общей патогенетической основе поражения суставов и почек при ЮИА.Тяжелая степень

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

течения ЮИА, характеризуется гиперактивацией иммунной системы и чрезмерной выработкой IL-6, что диктует необходимость поиска эффективных методов лечения и предупреждение побочных действий лекарств на МВС.

Литература

1. Алексеева Е.И, Валиева С.И., Апаева Д.И Эффективность различных режимов иммуносупрессивной терапии циклоспорином и метотрексатом у больных системным вариантом ювенильного ревматоидного артрита «Вопросы современной педиатрии» ТОМ 6; № 6; 2007; стр. 29-34.
2. Ахунова, Г.Р. Оценка функционального состояния щитовидной железы у больных ревматоидным артритом на фоне базисной и биологической терапии / Г.Р.Ахунова, Ф.В.Валеева, Т.А.Киселева // Терапевт.—2012.—№ 3.—С.9—14.
3. Балабанова, Р. Ревматоидный артрит: диагностика, лечение / Р.Балабанова // Врач.—2012.—№ 5.—С.6—9.
4. Вахлярская С.С., Кондратенко И.В., Бологов А.А., Инфликсимаб в терапии тяжелых форм ювенильного ревматоидного артрита у детей. Педиатрия, 2008г., Том 87, № 2 с.98-100.
5. Влияния тоцилицумабана систему транспорта холестерина крови и ранние проявления атеросклероза у больных ревматоидном артритом / Т.В.Попкова, Д.С.Новикова, Е.Ю.Панасюк и др. // Терапевтический архив-2012.—№ 5-С.10-18.
6. Волкова О.Н. Бактериальные лизаты топического действия в профилактике ОРЗ у детей, страдающих ювенильным ревматоидным артритом / О.Н. Волкова, Л.С. Намазова, М.П. Костинов // Тезисы V Конгресса детских инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики у детей». – Москва, 2006. – с .25.
7. Дыдыкина, И.С. Вторичный остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, переломы, лечение / И.С.Дыдыкина, Л.И.Алексеева, Е.Л.Насонов // Вестник семейной медицины.—2012.—№ 3-4.—С.32—38.
8. Madaminnova M.Sh., Tolipova N.K., Yusupova G.A., Musaeva A.F. Rehabilitation of children with juvenile rheumatoid arthritis. Journal Medicine: Theory and Practice. 2019;(4):324-326.
9. Насонов Е.Л. Эффективность и переносимость нестероидного противовоспалительного препарата Нимесулид: новые данные // РМЖ. — 2001. — № 15. — С. 6-8.
10. Насонов, Е.Л. Ревматоидный артрит: проблемы и значение персонифицированной медицины / Е.Л.Насонов // Терапевтический архив.—2012.—№ 5.—С.5—9.
11. Насонова В.А., Каратеев А.Е Применение нимесулида в ревматологии Журнал «Трудный пациент» / Архив / № 6–7–2010
12. Предикторы кардиоваскулярных и цереброваскулярных осложнений у больных ревматоидным артритом / Е.Е.Мясоедова, С.В.Обжерина, Н.Д.Святова, С.Е.Мясоедова // Клиническая медицина-2012.-№ 6-С.46—51.
13. Brun J., Jones R. / Nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated dyspepsia: the Scale of the problem // Am. J. Med. — 2001. — № 110. — P. 12-13.
14. Cassidy J.T., Petty R.E. Textbook of pediatric rheumatology. / Churchill Livingstone, New York etc., - 2001, p. 90-101.
15. Conforti A., Leone R., Moretti U. et al. Adverse drug reactions related to the use of NSAIDs with a focus on nimesulide: results of spontaneous reporting from a Northern Italian area // Drug. Saf. — 2001. — № 24. — P 1081-1090.
16. Daniel J. Mazanec, Russell C.DeMicco. Osteoarthritis and Rheumatoid arthritis.Current Diagnosis &Treathment. Pain; Medical Books| Me Graw –Hill. 2005; 14; 209-226.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

17. Edwards JCW., Leandro M.J., Cambridge G. B- lymphocytes depletion therapy in rheumatoid arthritis and other autoimmune disorders. Biochem. Soc. Trans. 2002; 30: 824-828.

18. Emery P, Breedveld FC, Hall S, et al. “Comparison of methotrexate monotherapy with a combination of methotrexate and etanercept in ac–tive, early, moderate to severe rheumatoid arthritis (COMET): a ran–domised, double–blind, parallel treatment trial” Lancet 2008;372:375–82.

19. Karimdzhanov I.A., Madaminova M.Sh., Iskanova G. H., Israilova N.A., Dinmuhammadieva D.R. Juvenile Idiopathic Arthritis: Etiopathogenesis, Therapy And Outcomes. Journal of Pharmaceutical Negative Results 2022, Volume 13, Special Issue 8, p. 498-506.

20. Karimdjanov I.A., Madaminova M.Sh., Dinmuxammadiyeva D.R., Iskanova G.X., Yusupova G.A., MallaevSh.Sh.Juvenile idiopathic arthritis and osteochondrosis of the lumbosacral joint. Case report.ЕвразийскийВестникпедиатрии 3(14) 2022, c.26-30. ISSN 2181-1954. EISSN 2181-1962.

21. Каримжанов И.А., Юсупова Г.А., Исканова Г.Х., Исраилова Н.А. Артериальная гипертензии как фактор риска развития хронической болезни почек у детей с врожденными аномалиями почек и мочевыводящих путей ВАПМП/CAKUT и ее коррекция. Нефрология. ТОМ 28; № 1; 2024; стр. 43-49.

22. Merlani G., Fox M., Oehen H.P. et al. Fatal hepatotoxicity secondary to nimesulide // Eur. J. Clin. Pharmacol. — 2001. — № 57. — P. 321-326.

23. O’Dell J.R. Theraputicstrategis of rheumatoid arthritis. N.Engl. J. Mad. 2004; 350: 2591-2602.

24. Osiri M., She A.B., Robinson V. et.al. “Leflunomide for the treatment of rheumatoid arthritis: a systematic review and meta–analysis” J. Rheum., 2003, 30: 1182–1190.

25. Pincus T., Koch G., Lei H., et al. Patient Preference for Placebo, Acetaminophen (paracetamol) or Celecoxib Efficacy Studies (PACES): two randomised, double blind, placebo controlled, crossover clinical trials in patients with knee or hip osteoarthritis // Ann. Rheum. Dis. 2004; 63: 931–939.

26. Pohjolainen T., Jekunen A., Autio L., Vuorela H. Treatment of acute low back pain with the COX-2-selective anti-inflammatory drug nimesulide: results of a randomized, double-blind comparative trial versus ibuprofen // Spine. 2000; 25 (12): 1579–1585.

27. Rainsford K. Current status of the therapeutic uses and actions of the preferential cyclo-oxygenase-2 NSAID, nimesulide // Inflammopharmacology. 2006; 14 (3–4): 120–137.

28. Saag K.G., Teng G.G., Patkar N.M. et.al. “American College of Rheu–matology 2008 Recommendations for the Use of Nonbiologic and Bio–logic Disease–Modifying Antirheumatic Drugs in Rheumatoid Arthritis” Arthr. Care and Res., 2008, 59: 762–784.

29. Scott DL, Smolen JS, Kalden JR, et al. ”Treatment of active rheumatoid ar–thritis with leflunomide: two year follow up of a double–blind, placebo–controlled trial versus sulfasalasine”. Ann Rheum Dis. 2001; 60: 913–923.

30. Silverman E., Spiegel L., Hawkins D. et al. Long-term open-label preliminary study of the safety and efficacy of leflunomide in patients with polyarticular course juvenile rheumatoid arthritis (JRA) // Arthritis. Rheum. — 2005; 52(2): 554—562.