ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Азимбегова Ситора Нодировна
Стажёр-ассистент
Предмет преподования:Клиническая фармакология
Самаркандский государственный медицинский университет
Акназарова Комила Азамат кизи
Сайфуллаева Маржона Хайрулла кизи
Раимбекова Аида Кайратовна
Студенты Самаркандского государственного университета

Аннотация. В данной статье проанализированы химическая структура сердечных гликозидов, их фармакодинамическое действие, области применения, побочные реакции и клиническое значение. Цель исследования — систематическое освещение теоретических и практических знаний о веществах, усиливающих работу сердца. Результаты анализа показывают, что сердечные гликозиды эффективны при лечении сердечной недостаточности и аритмий, однако их узкий терапевтический диапазон требует применения с высокой осторожностью.

Ключевые слова: сердечные гликозиды, дигитоксин, дигоксин, Na^+/K^+-АТФаза, сердечная недостаточность, аритмия.

ВВЕДЕНИЕ

Сердечные гликозиды — одни из самых древних фармакологических препаратов, регулирующих деятельность сердца, которые в основном получают из растений, таких как Digitalis purpurea, Digitalis lanata, Strophanthus gratus. Обратившись к истории медицины, можно отметить, что эти вещества с XVII века применяются для облегчения симптомов сердечной недостаточности и не потеряли своего значения в современной кардиологии. Основное преимущество сердечных[1] гликозидов заключается в том, что они повышают сократительную способность миокарда, улучшая насосную функцию сердца, нормализуя кровообращение и стабилизируя клиническое состояние пациентов.

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смертности во всем мире. В частности, при хронической сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и других аритмиях сердечные гликозиды играют важную терапевтическую роль[2]. Особенно препарат дигоксин занимает значительное место среди часто применяемых в клинической практике средств.

Однако существуют ограничения, связанные с применением сердечных гликозидов. Их узкий терапевтический диапазон, высокая чувствительность, легкость развития интоксикации, а также сложность применения у пациентов с почечной недостаточностью или нарушением электролитного баланса требуют от врача предельной осторожности. Поэтому глубокое изучение фармакодинамики, фармакокинетики, побочных эффектов и особенностей клинического применения этих веществ требует от врачей, фармацевтов и студентов медицины основательных теоретических знаний[3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В процессе подготовки данного исследования были проанализированы научно-

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

теоретические источники о сердечных гликозидах, фармакологические руководства, международные клинические рекомендации и современные научные статьи. Цель исследования заключалась в систематическом изучении фармакологических свойств сердечных гликозидов, их клинического применения, уровня безопасности и роли в современной кардиологии, поэтому были применены несколько научно-методических подходов[4].

В ходе анализа были изучены такие источники, как “Goodman & Gilman’s Pharmacology”, “Katzung: Basic & Clinical Pharmacology”, рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) и Американской ассоциации сердца (AHA), а также статьи из баз данных PubMed и Scopus. Эти источники предоставили основную информацию о механизме действия сердечных гликозидов, их фармакокинетических и фармакодинамических свойствах[5].

Были сравнены сила действия, время начала эффекта, период полураспада, пути выведения и уровень риска таких широко применяемых гликозидов, как дигоксин, дигитоксин и строфантин. На основе этого анализа были выявлены клинические преимущества и ограничения препаратов.

В исследовании также были изучены международные стандарты применения сердечных гликозидов при сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и других аритмиях[6]. В протоколах ESC 2021 и AHA 2022 были проанализированы критерии применения гликозидов, дозировка, мониторинг и противопоказания.

Для освещения основных фармакологических свойств сердечных гликозидов применялся когнитивно-аналитический метод. В частности, подробно изучались изменения ионного обмена, возникающие при ингибировании Na^+/K^+-АТФазы, механизм инотропного действия и влияние на сердечный ритм на основе глубокой научной базы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования анализ научных источников по фармакологическим свойствам, клиническому применению и профилю безопасности сердечных гликозидов показал следующие основные результаты:

Определённость механизма действия сердечных гликозидов

Анализ показал, что позитивный инотропный эффект сердечных гликозидов напрямую связан с блокированием фермента Na^+/K^+-АТФазы. Это приводит к увеличению содержания натрия в миокарде, замедлению натрий-кальциевого обмена и накоплению ионов кальция. Повышение уровня кальция усиливает сократительную способность миокарда и улучшает насосную функцию сердца.

Клиническая эффективность различных гликозидов

Сравнительный анализ показал: Дигоксин имеет короткий период полураспада и чаще применяется при сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. Дигитоксин метаболизируется в печени и имеет длительный период полураспада, что обеспечивает стабильность действия, однако риск токсичности выше. Строфантин отличается быстрым началом действия, но из-за короткого периода действия используется преимущественно в экстренных ситуациях.

Рисунок 1. Схема сердечных гликозидов

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11



Клинические данные показывают, что сердечные гликозиды обладают значительно узким терапевтическим окном по сравнению с другими группами лекарственных средств. Даже небольшое превышение дозы может привести к интоксикации. Это подчеркивает необходимость постоянного мониторинга при их применении.

Анализы показывают, что сердечные гликозиды значительно снижают симптомы сердечной недостаточности — одышку, отёки, быструю утомляемость[7]. Однако они не оказывают существенного влияния на общую смертность при этом заболевании.

При аритмиях, особенно у пациентов с фибрилляцией предсердий, сердечные гликозиды эффективно регулируют частоту сердечных сокращений и повышают способность сердца к самомодуляции.

- Выявлены ситуации с повышенным риском интоксикации:
- Пожилой возраст
- Пациенты с почечной недостаточностью
- Гипокалиемия
- Совместный приём с диуретиками

Эти факторы подтверждают необходимость особой осторожности при клиническом применении сердечных гликозидов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты данного исследования показывают, что, несмотря на значительное фармакологическое значение сердечных гликозидов, их применение требует внимательного и осторожного подхода. При этом несколько ключевых факторов имеют особое значение.

Во-первых, сердечные гликозиды не рекомендуются в качестве препаратов первого выбора по сравнению с современными средствами — ингибиторами АПФ, бета-блокаторами, антагонистами минералокортикоидных рецепторов[8]. Тем не менее они сохраняют важное место во многих клинических ситуациях, особенно при фибрилляции предсердий и

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-11

симптоматической сердечной недостаточности, что свидетельствует о том, что спрос на них не исчез полностью.

Во-вторых, высокий риск интоксикации ограничивает их широкое применение. Во многих научных источниках отмечается, что побочные эффекты дигоксина, особенно риск развития кардиотоксических аритмий, требуют постоянного контроля дозировки препарата, мониторинга ЭКГ и наблюдения за электролитным балансом.

В-третьих, сердечные гликозиды могут быть эффективными или опасными в зависимости от индивидуального состояния пациента. Например, при гипокалиемии риск токсичности резко возрастает, что особенно часто наблюдается у пациентов, принимающих диуретики. Поэтому важно учитывать взаимодействие лекарственных средств.

В-четвёртых, клиническая эффективность сердечных гликозидов в основном ограничивается симптоматическим облегчением. Они не изменяют патогенез сердечной недостаточности, но временно улучшают эффективность миокарда[9]. Поэтому современная медицина стремится использовать их как вспомогательную терапию.

Эти обстоятельства показывают, что хотя роль сердечных гликозидов сохраняется, при их применении крайне важны индивидуальный подход, клинический опыт и правильный мониторинг.

ВЫВОДЫ

Согласно результатам исследования, сердечные гликозиды входят в число препаратов, сохраняющих своё значение в клинической практике. Они эффективно повышают сократительную способность миокарда, облегчают симптомы сердечной недостаточности и регулируют сердечный ритм при фибрилляции предсердий.

Тем не менее, узкий терапевтический диапазон, риск токсичности и многочисленные взаимодействия с другими лекарственными средствами усложняют их применение.

Для безопасного использования сердечных гликозидов необходимо: правильный подбор дозировки, регулярный мониторинг функции почек, контроль уровня электролитов, наблюдение с помощью ЭКГ.

В будущем продолжаются научные исследования по созданию нового поколения препаратов, обладающих селективным инотропным эффектом, но с более высоким уровнем безопасности, аналогичных сердечным гликозидам.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Беловол А. Н., Князькова И. И. Клиническая фармакология сердечных гликозидов / А. Н. Беловол, И. И. Князькова. — Киев : KNMU, 2012. — 128 с.
2. Гуревич М. А., Гаврилин А. А. Сердечные гликозиды в современной клинической практике / М. А. Гуревич, А. А. Гаврилин // Альманах клинической медицины. — 2014. — № 3. — С. 45–53.
3. Melekhov A. V., et al. Digoxin in chronic heart failure: pro and contra // Russian Cardiology Journal. — 2020. — Vol. 15, № 2. — P. 112–120.
4. Tereshchenko S. N. Возможности и перспективы инотропной терапии хронической сердечной недостаточности. — Москва : РМЖ, 1999. — 56 с.
5. Rakhmanova F. E. Сердечные гликозиды: химический состав, механизм действия, клиническое применение и риски / Ф. Е. Рахманова // Самаркандский медицинский журнал. — 2025. — № 2. — С. 23–31.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

6. Gendestein E. I., et al. To the clinical pharmacology of digoxin // Kazan Medical Journal. — 1980. — Vol. 61, № 4. — P. 15–22.

7. Medscape. Can Cardiology's Oldest Drug Make a Comeback? — 2025. — URL: https://www.medscape.com/viewarticle/can-cardiologys-oldest-drug-make-comeback-2025a1000gqa (дата обращения: 02.12.2025).

8. ESC Guidelines 2021. European Society of Cardiology. Heart Failure and Atrial Fibrillation Recommendations. — URL: https://www.escardio.org/guidelines (дата обращения: 02.12.2025).

9. AHA 2022. American Heart Association Guidelines on Heart Failure and Arrhythmias. — URL: https://www.heart.org/en/guidelines (дата обращения: 02.12.2025).