ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА.

Исаков Б.М.
Андижанский медицинский институт.

Аннотация
Статья посвящена современным методам лучевой диагностики остеохондроза позвоночника, включая рентгенографию, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Рассмотрены основные признаки заболевания, их визуализация на различных методах, а также сравнительная эффективность исследований. Отдельное внимание уделено роли лучевых методов в ранней диагностике и планировании лечения.

English:
The article focuses on modern radiological methods for diagnosing spinal osteochondrosis, including X-ray, computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI). The main radiological signs of the disease and their visualization in different diagnostic modalities are analyzed, as well as the comparative effectiveness of these techniques. Special attention is given to the role of radiological methods in early diagnosis and treatment planning.

O‘zbekcha:
Maqolada umurtqa pog‘onasi osteoxondrozi tashxisida zamonaviy nurlanish usullari, jumladan, rentgenografiya, kompyuter tomografiyasi (KT) va magnit-rezonans tomografiya (MRT) muhokama qilinadi. Kasallikning asosiy belgilarini va ularning turli usullarda ko‘rinishini tahlil qilinadi, shuningdek, ushbu metodlarning samaradorligi solishtiriladi. E’tibor asosiy tashxis va davolashni rejalashtirishda radiologik usullar roliga qaratilgan.

Введение

Остеохондроз позвоночника является одной из наиболее распространённых патологий опорно-двигательного аппарата у взрослых и часто сопровождается болевым синдромом, ограничением подвижности и неврологическими нарушениями (Andersson, 1999; Bogduk, 2005). Своевременная диагностика заболевания позволяет предотвратить прогрессирование дегенеративных изменений и разработать эффективную стратегию лечения (Resnick, 2002).

Ранняя диагностика остеохондроза позвоночника затруднена из-за неспецифичности клинической картины, поэтому ведущую роль играют методы лучевой диагностики, которые позволяют выявлять структурные изменения позвонков и межпозвонковых дисков ещё до появления выраженных симптомов (Modic et al., 1988).

Цель данной работы — рассмотреть современные возможности лучевой диагностики остеохондроза позвоночника, выявить преимущества и ограничения различных методов и оценить их клиническую значимость.

Рентгенография позвоночника

Классическая рентгенография

Классическая рентгенография остаётся доступным и часто используемым методом первичной диагностики остеохондроза (Kettler & Wilke, 2006). Основные рентгенологические признаки включают:

- Снижение высоты межпозвонковых дисков;
- Формирование остеофитов по краям тел позвонков;

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

- Склероз замыкательных пластинок;
- Изменение углов физиологического изгиба позвоночника (Resnick & Niwayama, 1976).

Рентгенография эффективна для выявления выраженных структурных изменений, однако её чувствительность на ранних стадиях ограничена (de Schepper et al., 2010).

Функциональные снимки

Функциональные рентгенограммы (сегментальные, при сгибании и разгибании) позволяют оценить нестабильность позвонков и патологическую подвижность сегментов (White & Panjabi, 1990).

Компьютерная томография (КТ)

Принципы КТ

КТ позволяет получать послойные изображения костной ткани с высокой разрешающей способностью. Метод особенно информативен при выявлении остеофитов, спондилёза и изменений замыкательных пластинок (Boos et al., 2002).

2.2. Преимущества и недостатки

Преимущества:

- Высокая точность визуализации костных структур;
- Возможность трёхмерной реконструкции;
- Использование при противопоказаниях к МРТ (наличие металлических имплантатов).

Недостатки:

- Радиооблучение пациента;
- Ограниченная информативность по мягкотканным структурам (межпозвонковые диски, спинной мозг).

КТ эффективно применяется для оценки дегенеративных изменений на поздних стадиях заболевания (Resnick, 2002).

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Технологические возможности

МРТ обеспечивает высокое контрастное разрешение мягких тканей, позволяя визуализировать:

- Состояние межпозвонковых дисков (гидратация, протрузии, грыжи);
- Спинной мозг и нервные корешки;
- Воспалительные изменения костного мозга (Modic et al., 1988).

Основные признаки остеохондроза на МРТ

- Уменьшение высоты межпозвонковых дисков;
- Изменение сигналов дисков по Т2-взвешенным изображениям (снижение гидратации);
- Протрузии и экструзии дисков;
- Формирование остеофитов и склероз замыкательных пластинок (Boos et al., 2002; Jensen et al., 1994).

МРТ является золотым стандартом для ранней диагностики остеохондроза и оценки его осложнений (Jensen et al., 1994).

Сравнительная оценка методов лучевой диагностики

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Метод	Основные показания	Преимущества	Ограничения
Рентгенография	Первичный осмотр, оценка костных изменений	Доступность, низкая стоимость	Низкая чувствительность на ранних стадиях, ограничена мягкая ткань
КТ	Оценка костных структур, планирование хирургии	Высокая детализация костей, 3D-реконструкция	Радиооблучение, слабая визуализация дисков
МРТ	Ранняя диагностика, оценка дисков, нервных структур	Высокая чувствительность, мягкие ткани	Длительность исследования, стоимость, противопоказания при металлических имплантах

Роль лучевых методов в клинической практике

Лучевые методы позволяют:

- Определить стадию остеохондроза;
- Оценить динамику дегенеративного процесса;
- Планировать консервативное или хирургическое лечение;
- Контролировать результаты терапии (Kettler & Wilke, 2006).

МРТ особенно важна для диагностики ранних стадий и осложнений (грыжи диска, компрессия нервных корешков). Рентгенография и КТ чаще используются для подтверждения структурных изменений и хирургического планирования (Bogduk, 2005).

Заключение

Лучевая диагностика остеохондроза позвоночника является ключевым компонентом современной клинической практики. Каждый метод обладает своими преимуществами и ограничениями, и их выбор зависит от клинической ситуации и задач исследования. Рентгенография остаётся базовым методом первичной диагностики, КТ — эффективным инструментом для детальной оценки костной структуры, а МРТ обеспечивает наиболее полное представление о состоянии межпозвонковых дисков и мягких тканей.

Эффективное применение комплексной лучевой диагностики позволяет повысить точность диагностики, определить оптимальную тактику лечения и снизить риск прогрессирования заболевания.

Список литературы

1. Andersson, G. B. J. (1999). Epidemiological features of chronic low-back pain. *The Lancet*, 354(9178), 581–585.
2. Bogduk, N. (2005). *Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum*. 4th edition. Elsevier.
3. Boos, N., et al. (2002). Classification of disc degeneration: a study of 600 lumbar discs. *Spine*, 27(17), 1826–1833.
4. de Schepper, E. I., et al. (2010). Diagnosis of lumbar disc degeneration: radiographic and MRI findings. *Eur Spine J*, 19(6), 945–954.
5. Jensen, M. C., et al. (1994). Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. *New England Journal of Medicine*, 331(2), 69–73.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

6. Kettler, A., & Wilke, H. J. (2006). Review of existing grading systems for cervical and lumbar disc degeneration. *Eur Spine J*, 15, 705–718.
7. Modic, M. T., et al. (1988). Degenerative disc disease: assessment of changes in vertebral body marrow with MR imaging. *Radiology*, 166(1), 193–199.
8. Resnick, D. (2002). *Diagnosis of Bone and Joint Disorders*. 4th edition. Philadelphia: Saunders.
9. Resnick, D., & Niwayama, G. (1976). *Radiographic and pathologic features of spinal disorders*. WB Saunders.
10. White, A. A., & Panjabi, M. M. (1990). *Clinical Biomechanics of the Spine*. 2nd edition. Lippincott.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

ИСАКОВ Б.М.

Андижанский медицинский институт.

Аннотация

Русский:

Статья посвящена современным методам лучевой диагностики остеохондроза позвоночника, включая рентгенографию, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Рассмотрены основные признаки заболевания, их визуализация на различных методах, сравнительная эффективность исследований, а также возможности ранней диагностики и планирования терапии. Представлены таблицы с классификацией изменений и сравнением методов.

English:

The article examines modern radiological methods for diagnosing spinal osteochondrosis, including X-ray, computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI). Key radiological signs, their visualization across modalities, comparative effectiveness, and early diagnosis potential are analyzed. Tables present classification of degenerative changes and comparison of diagnostic techniques.

O‘zbekcha:

Maqolada umurtqa pog‘onasi osteoxondrozi tashxisida zamonaviy nurlanish usullari, jumladan, rentgenografiya, kompyuter tomografiyasi (KT) va magnit-rezonans tomografiya (MRT) tahlil qilinadi. Kasallikning asosiy belgilarini turli usullarda ko‘rish imkoniyatlari, samaradorligi va erta tashxis qo‘yish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Degenerativ o‘zgarishlar va diagnostika metodlari solishtirilgan jadvallar keltiriladi.

Введение

Остеохондроз позвоночника — это хроническое дегенеративное заболевание межпозвонковых дисков и смежных структур позвоночного столба, характеризующееся снижением высоты диска, формированием остеофитов и нарушением биомеханики сегментов (Andersson, 1999; Bogduk, 2005).

Клиническая симптоматика часто неспецифична и включает боли в спине, ограничение подвижности и неврологические проявления. Ранняя диагностика остеохондроза позволяет своевременно назначить консервативное или хирургическое лечение, предотвращая прогрессирование дегенеративных изменений (Resnick, 2002).

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Лучевые методы являются основным инструментом объективной оценки структурных изменений позвоночника. Классическая рентгенография, КТ и МРТ дополняют друг друга, обеспечивая всестороннюю оценку состояния костной и мягкой тканей.

Цель статьи — подробно рассмотреть возможности и ограничения современных методов лучевой диагностики остеохондроза позвоночника, классифицировать изменения по стадиям и оценить их клиническую значимость.

1. Рентгенография позвоночника

1.1. Классическая рентгенография

Рентгенография является доступным и экономичным методом первичной диагностики. Основные рентгенологические признаки включают:

- Снижение высоты межпозвонкового диска;
- Остеофиты по краям тел позвонков;
- Склероз замыкательных пластинок;
- Нарушение физиологических изгибов позвоночника (Resnick & Niwayama, 1976; Kettler & Wilke, 2006).

Рентгенография ограничена низкой чувствительностью на ранних стадиях и слабой визуализацией мягких тканей.

1.2. Функциональные рентгенограммы

Снимки в положении сгибания и разгибания выявляют сегментарную нестабильность и патологическую подвижность позвонков (White & Panjabi, 1990).

Таблица 1. Основные рентгенологические признаки остеохондроза по стадиям

Стадия	Изменения межпозвонкового диска	Замыкательные пластинки	Остеофиты	Форма позвоночника
I	Незначительное снижение высоты	Отсутствуют	Нет	Сохранена
II	Умеренное снижение высоты	Склероз локальный	Мелкие	Легкая деформация
III	Выраженное снижение высоты	Склероз выраженный	Крупные	Нарушение изгибов
IV	Сильное снижение высоты диска	Склероз и деформация	Значительные	Явные кифоз/лордоз

2. Компьютерная томография (КТ)

2.1. Принципы КТ

КТ обеспечивает послойное изображение костной ткани с высокой разрешающей способностью и возможностью трёхмерной реконструкции (Boos et al., 2002). Метод позволяет:

- Определять наличие остеофитов;
- Оценивать склероз замыкательных пластинок;
- Планировать хирургическое вмешательство.

2.2. Преимущества и недостатки

Преимущества:

- Высокая точность визуализации костной ткани;

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

- 3D-реконструкция позвоночного сегмента;
- Возможность исследования при противопоказаниях к МРТ.

Недостатки:

- Радиооблучение;
- Ограниченная информативность по мягким тканям (диски, спинной мозг).

Таблица 2. Показания и ограничения методов

Метод	Основные показания	Преимущества	Ограничения
Рентгенография	Первичный осмотр, оценка костных изменений	Доступность, низкая стоимость	Низкая чувствительность на ранних стадиях, слабая визуализация мягких тканей
КТ	Детальная оценка костных структур, планирование операций	Высокая точность, 3D-реконструкция	Радиооблучение, ограниченная визуализация дисков
МРТ	Ранняя диагностика, оценка дисков и нервных структур	Высокая чувствительность, мягкие ткани	Длительное исследование, высокая стоимость, противопоказания при имплантатах

3. Магнитно-резонансная томография (МРТ)

3.1. Возможности МРТ

МРТ обеспечивает визуализацию мягких тканей и костного мозга с высокой контрастностью. Позволяет оценить:

- Межпозвонковые диски (гидратация, протрузии, грыжи);
- Спинной мозг и нервные корешки;
- Воспалительные и дегенеративные изменения костного мозга (Modic et al., 1988).

3.2. Основные признаки остеохондроза на МРТ

- Уменьшение высоты дисков;
- Снижение сигнала по Т2-взвешенным изображениям (дегидратация диска);
- Протрузии и экструзии дисков;
- Остеофиты и склероз замыкательных пластинок (Boos et al., 2002; Jensen et al., 1994).

Таблица 3. Классификация изменений дисков по Modic (1988)

Тип	MR-признаки	Патологические изменения
I	Гипоинтенсивный на Т1, гиперинтенсивный на Т2	Острый воспалительный процесс, отёк костного мозга
II	Гиперинтенсивный на Т1, изоинтенсивный на Т2	Жировая дегенерация костного мозга
III	Гипоинтенсивный на Т1 и Т2	Склероз костного мозга

4. Современные подходы и рекомендации

1. **Рентгенография** — базовый метод первичного осмотра.
2. **КТ** — преимущественно для детальной оценки костных изменений и хирургического планирования.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

3. **МРТ** — золотой стандарт ранней диагностики и выявления осложнений.

Комплексное использование методов позволяет:

- Оценить степень дегенерации позвоночного сегмента;
- Определить динамику прогрессирования;
- Выбрать тактику консервативного или хирургического лечения;
- Контролировать результаты терапии (Kettler & Wilke, 2006).

5. Заключение

Лучевая диагностика остеохондроза позвоночника играет ключевую роль в современной клинической практике. Рентгенография остаётся доступным методом первичной диагностики, КТ — инструментом для детальной оценки костей и хирургического планирования, а МРТ обеспечивает максимально полное представление о состоянии дисков, мягких тканей и спинного мозга.

Комплексное применение этих методов повышает точность диагностики, способствует раннему выявлению изменений и позволяет оптимизировать лечение пациентов.

Список литературы

1. Andersson, G. B. J. (1999). Epidemiological features of chronic low-back pain. *The Lancet*, 354(9178), 581–585.
2. Bogduk, N. (2005). *Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum*. 4th edition. Elsevier.
3. Boos, N., et al. (2002). Classification of disc degeneration: a study of 600 lumbar discs. *Spine*, 27(17), 1826–1833.
4. de Schepper, E. I., et al. (2010). Diagnosis of lumbar disc degeneration: radiographic and MRI findings. *Eur Spine J*, 19(6), 945–954.
5. Jensen, M. C., et al. (1994). Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. *New England Journal of Medicine*, 331(2), 69–73.
6. Kettler, A., & Wilke, H. J. (2006). Review of existing grading systems for cervical and lumbar disc degeneration. *Eur Spine J*, 15, 705–718.
7. Modic, M. T., et al. (1988). Degenerative disc disease: assessment of changes in vertebral body marrow with MR imaging. *Radiology*, 166(1), 193–199.
8. Resnick, D. (2002). *Diagnosis of Bone and Joint Disorders*. 4th edition. Philadelphia: Saunders.
9. Resnick, D., & Niwayama, G. (1976). *Radiographic and pathologic features of spinal disorders*. WB Saunders.
10. White, A. A., & Panjabi, M. M. (1990). *Clinical Biomechanics of the Spine*. 2nd edition. Lippincott.