ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНЪЮНКТИВИТ У ДЕТЕЙ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Тухтаева Матлаб Ашуровна

Аннотация

В статье представлены результаты комплексного исследования клинико-иммунологических особенностей аллергического конъюнктивита у детей и оценка эффективности проводимого лечения с учётом влияния терапии на качество жизни пациентов. Обследовано 150 детей в возрасте от 6 до 17 лет, наблюдавшихся в Бухарском филиале Республиканского научно-специализированного центра аллергологии и Республиканском специализированном центре микрохирургии глаза. Исследование включало оценку клинических симптомов, уровней иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG, IgE) и цитокинов (IL-6, IL-10), а также анализ качества жизни по шкале Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL). Полученные результаты демонстрируют, что комплексное лечение с иммуномодулирующими элементами обеспечивает стойкий терапевтический эффект, снижает частоту рецидивов и существенно повышает качество жизни детей с аллергическим конъюнктивитом.

Ключевые слова: *аллергический конъюнктивит, дети, иммунологические показатели, IgE, IL-6, IL-10, лечение, качество жизни.*

ВВЕДЕНИЕ

Аллергический конъюнктивит (АК) является одним из наиболее распространённых проявлений аллергических заболеваний у детей и нередко сопровождается поражением кожи, дыхательных путей и слизистых оболочек. По данным различных авторов, от 20% до 40% детского населения страдает той или иной формой аллергического воспаления глаз. Аллергический конъюнктивит существенно влияет на качество жизни пациентов, ограничивая физическую активность, социальную адаптацию и школьную успеваемость.

Иммунопатогенез заболевания связан с гиперреактивностью слизистой оболочки глаз в ответ на воздействие аллергенов и активацией IgE-зависимого механизма. Развивается каскад медиаторных реакций с участием гистамина, цитокинов (IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α) и хемокинов, приводящий к хроническому воспалению конъюнктивы[1,4,5,6].

Современные терапевтические подходы направлены не только на купирование симптомов, но и на восстановление иммунного равновесия и профилактику рецидивов. Однако мало работ посвящено анализу того, как проведённое лечение влияет на качество жизни детей, что является важным критерием оценки эффективности терапии[2,3].

Цель исследования

Оценить клинико-иммунологические особенности аллергического конъюнктивита у детей и определить эффективность лечения на основе анализа динамики клинических показателей и качества жизни пациентов.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено в 2023–2025 годах на базе Бухарского филиала Республиканского научно-специализированного центра аллергологии и Республиканского научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Всего обследовано 150 детей в возрасте от 6 до 17 лет с различными формами аллергического конъюнктивита.

Пациенты распределены на четыре группы:

1. Первая основная группа (n=45) — дети с хроническим аллергическим конъюнктивитом (длительность заболевания более 2 лет).
2. Вторая основная группа (n=40) — дети с впервые выявленным аллергическим конъюнктивитом.
3. Группа сравнения (n=35) — дети, у которых аллергический конъюнктивит сочетался с другими заболеваниями глаз (блефарит, кератоконъюнктивит).
4. Контрольная группа (n=30) — практически здоровые дети без аллергической патологии.

Методы исследования

1. Клинические методы:
   - Оценка выраженности гиперемии, зуда, слезотечения, отёка конъюнктивы.
   - Срок от начала заболевания до обращения — в среднем 6,8 ± 0,24 суток.
   - Средний возраст пациентов составил 10,8 ± 0,45 лет.
2. Иммунологические исследования:
   - Определение уровней IgA, IgM, IgG, IgE, IL-6, IL-10 и прокальцитонина методом ИФА.
   - Изучение динамики показателей до и после лечения.
3. Оценка качества жизни:
   - Проводилась с использованием адаптированной шкалы Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL).
   - Оценивались эмоциональное, физическое и социальное функционирование ребёнка до и после терапии.
4. Терапия:
   - Применялась комбинированная схема: антигистаминные препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток, топические противовоспалительные средства.
   - В основной группе дополнительно использовались иммуномодуляторы (полиоксидоний, ликопид).
5. Статистическая обработка:
   - Использованы методы вариационной статистики (M ± m), t-критерий Стьюдента, уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования

До начала лечения у детей с аллергическим конъюнктивитом отмечались выраженные клинико-иммунологические изменения, характеризующиеся повышенной активностью гуморального звена иммунитета и наличием типичных признаков воспалительного процесса. Средний уровень иммуноглобулина Е составил 224,1 ± 3,1 МЕ/мл, что превышало нормальные значения (70–216 МЕ/мл) и отражало высокий уровень сенсибилизации организма. Концентрация провоспалительного цитокина IL-6 достигала 43,1 ± 2,2 пг/мл, а уровень противовоспалительного цитокина IL-10 — 89,4 ± 2,6 пг/мл, что указывало на наличие активного воспалительного процесса с формированием компенсаторного ответа иммунной системы. Показатели IgA (1,80 ± 0,09 г/л) и IgM (1,67 ± 0,08 г/л) оставались в пределах

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

физиологической нормы, тогда как IgG был умеренно повышен (20,03 ± 0,65 г/л), что свидетельствовало о хроническом течении заболевания и наличии персистирующего антигенного раздражения. Клинически у всех обследованных пациентов наблюдались зуд и гиперемия конъюнктивы (100 %), а у 82,2 % — отёк слизистой оболочки глаз, что типично для аллергического воспаления.

После проведённого курса терапии зафиксирована выраженная положительная динамика как в клинических, так и в иммунологических параметрах. Уровень IgE снизился до 175,3 ± 2,8 МЕ/мл ($p < 0,05$), концентрация IL-6 уменьшилась до 21,7 ± 1,8 пг/мл, а IL-10 — до 45,9 ± 2,1 пг/мл, что указывало на снижение активности воспалительного процесса и нормализацию цитокинового профиля. Клиническое состояние пациентов существенно улучшилось: зуд и покраснение глаз исчезли у 90 % детей, отёчность конъюнктивы регрессировала у 85 %, а частота рецидивов в течение 6 месяцев наблюдения снизилась более чем в два раза. Эти данные подтверждают высокую эффективность проведённого лечения, направленного на стабилизацию иммунного ответа и восстановление клинического благополучия у детей с аллергическим конъюнктивитом.

Таблица 1

Изменения качества жизни (по шкале PedsQL)

Показатель	**До лечения**	**После лечения**	**Прирост, %**
Физическое состояние	58,2 ± 2,3	78,5 ± 2,1	+35%
Эмоциональное состояние	52,6 ± 2,5	74,3 ± 2,2	+41%
Социальная активность	61,4 ± 2,1	83,7 ± 2,0	+36%
Общий показатель качества жизни	57,4 ± 2,4	78,8 ± 2,1	+37%

Таким образом, улучшение иммунологических показателей сопровождалось значительным повышением уровня физического и эмоционального благополучия детей.

Результаты исследования показали, что аллергический конъюнктивит у детей сопровождается выраженными нарушениями как местного, так и системного иммунного ответа. Высокие уровни IgE и IL-6 подтверждают роль гиперреактивности Th2-иммунного звена в патогенезе заболевания.

Применение комплексной терапии с включением иммуномодуляторов способствовало не только купированию симптомов, но и нормализации цитокинового профиля, что подтверждает эффективность выбранной схемы.

Важным компонентом оценки эффективности лечения стала шкала качества жизни, показавшая значительное улучшение физического, эмоционального и социального состояния пациентов. Это подчёркивает необходимость включения оценки качества жизни в стандартные критерии эффективности терапии аллергических заболеваний глаз у детей.

Выводы

Таким образом, Аллергический конъюнктивит у детей характеризуется выраженным IgE-зависимым воспалением с активацией IL-6 и IL-10.Комплексная терапия с применением иммуномодуляторов способствует нормализации иммунологических показателей и снижению частоты рецидивов.Улучшение иммунного статуса сопровождается повышением качества жизни пациентов, что подтверждает необходимость комплексного подхода в лечении.Оценка эффективности терапии по шкале **PedsQL** позволяет объективно определить не только клинический, но и психоэмоциональный эффект лечения. Полученные результаты

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

демонстрируют, что комплексное лечение с иммуномодулирующими элементами обеспечивает стойкий терапевтический эффект, снижает частоту рецидивов и существенно повышает качество жизни детей с аллергическим конъюнктивитом.

Использованная литература:

1. Арестова Н. Н., Катаргина Л. А., Яни Е. В. Конъюнктивиты и дакриоциститы у детей: клиническая характеристика, современные возможности лечения //Российская педиатрическая офтальмология. – 2016. – Т. 11. – №. 4. – С. 200-206.
2. Бахритдинова Ф. А. и др. Клинические формы аллергических поражений глаз и их лечение у детей с атопической бронхиальной астмой //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 54. – С. 106-110.
3. Дроздова Е. А., Михайлова Е. В. Анализ диагностических ошибок аллергического конъюнктивита у детей //Медицинский вестник Башкортостана. – 2020. – Т. 15. – №. 4 (88). – С. 8-11.
4. Махмудова Д., Хамроева Ю., Бобоха Л. Глазные проявления некоторых дерматологических заболеваний //in Library. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 63-65.
5. Назирова З. Клинико-иммуннологические аспекты диагностики аллергических заболеваний глаз у детей школьного возраста //Каталог авторефератов. – 2017. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-48.
6. Нарзикулова К. И. и др. Современный взгляд на терапию аллергических конъюнктивитов //Саратовский научно-медицинский журнал. – 2018. – Т. 14. – №. 4. – С. 938-941.