ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ

Нормуродова Р.З.
Ташкентский государственный медицинский университет
Кафедра госпитальной ортопедической стоматологии

Аннотация. В последние годы на ортодонтическом приёме увеличилось число пациентов с отсут- ствием постоянных зубов. Частота отсутствия зачатков зубов, по данным различных авторов, колеблется от 2% до 16,5%. Лидирующее место занимает адентия боковых резцов верхней челюсти. Сложность проблемы обусловлена повышением уровня эстетических требований со стороны пациентов, особенно в ситуации дефи- цита объема кости в области альвеолярного гребня. Лечение таких пациентов требует комплексного подхода с обеспечением междисциплинарной курации и использованием цифровых технологий.
Ключевые слова: первичная адентия, ортодонтическое лечение, хирургический шаблон, дентальные имплантаты, цифровое планирование, внутриротовое сканирование, технология CAD/CAM.

Цель исследования — повышение эффективности лечения пациентов с первичной адентией с использованием цифрового плани- рования, хирургических шаблонов, внутриротового сканирования, CAD/CAM-моделирования безметалловых коронок винтовой фиксации на дентальных имплантатах.

Материалы и методы. Клиническое исследование проводилось на базе стоматологической клиники «ПрезиДент» (г. Чебоксары) в период с 2018 г. по 2023 г. Общее число пациентов — 24 человека (женского пола) в возрасте от 16 до 34 лет. Пациенты были распределены на две группы (n=12). Пациентам первой группы замещение отсутствующих зубов проводили с использованием дентальной имплантации по традиционной методике без применения цифровых технологий, пациентам второй группы – с использованием цифровых технологий. Проведена оценка состояния десны в области дефекта зубного ряда: степень выраженности феномена стиплинга, плотность прилегания десневого края к конструкционным материалам, вакуумная устойчивость капилляров по Кулаженко, индекс кровоточивости по Мюллеману-Коуэллу. Для статистической обработки полученных результатов применяли пакет программ SPSS 13.0. **Результаты и их обсуждение.** Первый этап лечения включал ортодонтическое лечение, установку брекет-системы и диста- лизацию клыков. Некоторым пациентам устанавливали ортодонтические мини-винты в подскуловой зоне для дистализации боковых сегментов верхнего зубного ряда. После создания промежутков для будущих боковых резцов изготавливали хирургический шаблон и проводили установку дентальных имплантатов. Через четыре месяца после имплантации была снята брекет-система и установлены временные коронки на имплантатах, через полгода установлены цифровые безметалловые ортопедические конструкции по технологии CAD/CAM. Нами не было выявлено ни одного случая потери имплантата. Была разработана основа алгоритма ведения пациентов с адентией латеральных резцов верхней челюсти. **Выводы.** Применение компьютерных программ для плани- рования дентальной имплантации, навигационной хирургии позволяет наиболее точно установить

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

дентальные имплантаты, изготовить цифровые безметалловые ортопедические конструкции по технологии компьютерного моделирования и производства. Таким образом, снижается риск осложнений и достигается эффективное функ- циональное и эстетическое состояние зубочелюстной системы у пациентов с первичной адентией.

Первичная адентия относится к одной из наи- более тяжёлых форм зубочелюстных аномалий [7]. Лечение пациентов при отсутствии зачатков зубов требует серьёзного индивидуального подхода и ком- плексного лечения [7, 8, 9, 10, 11]. Наиболее часто встречается двусторонняя адентия боковых резцов верхней челюсти. Распространённость первичной адентии постоянных зубов у детей варьирует от 2% до 16,5% в популяции [7]. Проблема первичной адентии сегодня представляется остроактуальной, что обусловлено эволюционными изменениями зубочелюстного аппарата человека, ухудшением экологической ситуации в регионах, а также значи- тельными материальными затратами на реабили- тацию. Среди причин повреждения и рассасывания зубных зачатков выделяют эндокринный дисбаланс, нарушения обмена веществ у плода, перенесённые инфекционные заболевания в раннем возрасте, врожденные аномалии развития, дефицит фтора в питьевой воде, низкий уровень инсоляции, повы- шенный радиоактивный фон и другие [2, 12, 13].

Сегодня пациенты уделяют большое внимание эстетической составляющей стоматологического ле- чения. Выбор эффективного метода лечения при на- рушении целостности зубного ряда является слож- ной задачей для практикующего врача-стоматолога. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в стоматологической практике расширило возмож- ности лечения пациентов с первичной адентией [1,8, 11]. На первичной консультации пациентам пред- лагаются возможные методы лечения: установка дентального имплантата в области отсутствующих зубов; протезирование съёмными протезами; про- тезирование мостовидными протезами протяжён- ностью от 3 до 6 единиц или установка адгезивного мостовидного протеза. Для точного переноса плана хирургического вмешательства, установки денталь- ных имплантатов, используют компьютерный хи- рургический шаблон, который является связующим между конусно-лучевой компьютерной томографией (КЛКТ), планом лечения и хирургической операцией. В настоящее время врачи-стоматологи добиваются того, чтобы создать естественный эффект «вырас- тания» коронки на дентальном имплантате из десны. В современной имплантологии используются био- совместимые материалы и цифровые технологии, поэтому конструкции обладают сверхточностью [1, 4, 5, 6, 10, 11]. Современная технология CAD/ CAM (Computer-aided design and Computer-aided manufacturing) — это производство каркасов зубных протезов, коронок для имплантатов и виниров с помощью компьютерного моделирования и фрезе- рования на станках с программным управлением [7]. Совершенствование методик трехмерного сканирования, а также технологий компьютерного моделирования и производства повышает точность эстетических параметров коронок на дентальных имплантатах, облегчает создание так называемых «невидимых» реставраций. Успешный эстетический результат протезирования предполагает «незамет- ность» реставрации, её гармоничное сочетание с прилегающими зубами и мягкими тканями. В по- следние годы врачи-стоматологи и зубные техники уделяют большое внимание «белой эстетике» и параметрам «розовой эстетики» [14]. Коронка, из- готовленная при соблюдении всех протоколов, не будет иметь эстетического результата, если при- легающая десна имеет признаки воспалительного процесса. Врачам-стоматологам зачастую бывает сложно добиться

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

идеальной «розовой эстетики» мяг- ких тканей, прилегающих к поверхности абатмента [14]. Большое значение имеет прикрепление десны, отвечающее за своего рода инфекционную «без-опасность» подлежащей кости. Для удовлетворения этих запросов необходима разработка комплексного подхода при лечении пациентов с обеспечением междисциплинарной курации и использованием цифровых технологий.

Цель исследования – повышение эффектив- ности лечения пациентов с первичной адентией с использованием цифрового планирования, хирур- гических шаблонов, внутриротового сканирования, CAD/CAM-моделирования безметалловых коронок винтовой фиксации на дентальных имплантатах.

Материалы и методы исследования. В основу настоящего исследования был положен клинический анализ результатов наблюдения пациентов с аден- тией постоянных зубов на базе стоматологической клиники «ПрезиДент» (г. Чебоксары) в период с 2018 по 2023 год. Общее число пациентов составило 24 человека (женского пола) в возрасте от 16 до 34 лет. Первый этап курации пациентов заключался в определении исходного уровня гигиены рта и об- учении индивидуальной гигиене рта с обязательным использованием ирригационных технологий. Затем проводилась профессиональная гигиена рта (уль- тразвуковой скейлинг, ультрадисперсная полировка (технология Air Flow), полировка абразивными па- стами, медикаментозная обработка, оксигенация). Все пациенты были мотивированы к контролю ги- гиенического состояния рта в домашних условиях с помощью индикаторов зубного налёта.Метод имплантации был применен всем пациен- там с предшествующим ортодонтическим лечением брекет-системами продолжительностью от года до двух лет. Для оценки состояния костной ткани ис- пользовали КЛКТ. Все пациенты были разделены на две группы (n=12) методом случайной выборки. Пациентам первой группы проводили замещение отсутствующих зубов с использованием денталь- ной имплантации по традиционной методике без применения цифровых технологий. Пациентам второй группы проводили дентальную импланта- цию посредством предоперационного цифрового планирования, использования хирургического шаблона, внутриротового сканирования, CAD/CAM- моделирования безметалловых коронок винтовой фиксации на дентальных имплантатах.Протезирование всех пациентов было прове-дено с применением технологии компьютерного моделирования. Протезирование пациентам прово- дилось безметалловыми конструкциями технологии Procera. Все коронки на дентальных имплантатах были изготовлены из диоксида циркония, винтовой фиксации с опорой на имплантатах, заказанных в производственных центрах Nobel Procera (Sweden, Goteborg; USA, New York).Для лечения пациентов с врождённой аденти- ей разработан и клинически обоснован алгоритм лечебных мероприятий с включением цифрового планирования, хирургических шаблонов, внутри- ротового сканирования, CAD/CAM-моделирования безметалловых коронок винтовой фиксации, пре- восходящий по своей эффективности традицион- ные методы лечения *(рис. 1)*. За основу был взят алгоритм, разработанный в отделении клинической и экспериментальной имплантологии Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.Для оценки состояния десны в области дефекта зубного ряда применяли следующие показатели: степень выраженности феномена стиплинга, плот- ность прилегания десневого края к конструкционным материалам, вакуумную устойчивость капилляров по Кулаженко, индекс кровоточивости по Мюлле- ману-Коуэллу.Статистическая обработка результатов ис- следования проводилась с

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

применением пакета статистических программ SPSS 13.0: сравнение распределений выборок с нормальным (тест Колмо- горова-Смирнова), корреляционный анализ Пирсона и Спирмена (для ранговых значений). При нор- мальном распределении значений в исследуемых группах были определены средние арифметические величины (M), стандартные ошибки (m) и диапазон изменений (min–max). Статистически значимые различия выборок между собой оценивали с исполь- зованием параметрического критерия Стьюдента и критерия Фишера. Статистически значимым при- нимали значение ошибки $p \leq 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Известно, что со временем положение зубов изменяется и требует коррекции или замены протезов. Изготовление хирургического шаблона обеспечивает точный перенос интерактивного плана в участок хирургиче- ского вмешательства и позволяет точно установить дентальные имплантаты. Идеальное положение дентального имплантата — минимум 1,5 мм от корня соседнего зуба. Минимально допустимое расстоя- ние для установки имплантатов между центральны- ми резцами и клыками — 5,5 мм. У трёх пациентов (25%) первой группы в послеоперационном периоде отмечалось недостаточное мезио-дистальное кор- невое расстояние, что потребовало применения повторного ортодонтического лечения, направлен- ного на увеличение расстояния между соседними зубами. Сроки лечения увеличились до одного года. Во второй группе только у одного пациента была проведена корреляция контактных поверхностей коронок на дентальных имплантатах.При оценке состояния десны оказалось, что феномен стиплинга оказался ярко выражен у семи пациентов первой группы (58%) и у одиннадцати пациентов второй группы (91%, $p>0,05$). Единич- ные случаи очаговой потери феномена стиплинга в обеих наблюдаемых группах пациентов были связаны с бактериально-ассоциированным вос- палением маргинальной и альвеолярной дес- ны. Причиной воспаления в указанных случаях явилось недостаточное внимание к проведению гигиенического ухода за ротовой полостью в до- машних условиях.При оценке краевого прилегания десны к кон- струкционным материалам было установлено, что оно было плотным у пяти пациентов (41%) первой группы и десяти пациентов (83%, $p<0,01$) второй группы. У трёх пациентов первой группы десневая манжетка не имела признаков воспаления, однако ее тургор был снижен без признаков воспаления. У четырёх пациентов этой группы снижение плотности прилегания было обусловлено бактериально-ассо- циированным воспалением. Индекс Мюллемана-Ко- уэлла у этих пациентов оказался равным 2,41±0,05 балла. У одного пациента второй группы было вы- явлено снижение тургора при отсутствии воспале- ния, у второго пациента рыхлость прилегания былаобусловлена воспалением. Индекс Мюллемана-Ко- уэлла у этого пациента оказался равным 2,4 балла.Оценка стойкости капилляров по Кулаженко не выявила существенных различий у пациентов обеих наблюдаемых групп и составила 42,3±8,1 с у пациентов первой группы и 48,1±7,4 с у пациентов второй группы ($p>0,05$).Во всех случаях выявления бактериально-ас- социированного воспаления мягких тканей, окру- жающих имплантат, потребовалось проведение пародонтологических вмешательств по устранению зубной бляшки, в том числе поддесневой, с приме- нением антисептических и противовоспалительных препаратов.

В качестве иллюстрации приводим клинический случай.

Пациентка Н., 20 лет обратилась в клинику с жалобами на эстетическую неудовлетворённость из-за отсутствия верхних боковых резцов. При объ- ективном обследовании выявлены симметричность лица, видимые кожные покровы чистые, поднижне-

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

челюстные лимфоузлы не увеличены. В ротовой полости: преддверие средней глубины, достаточная площадь кератинизированной десны, прикрепление уздечек губ и языка без патологических изменений. Отсутствуют латеральные резцы верхней челюсти. Десна в области всех зубов бледно-розового цвета, с выраженным феноменом стиплинга. Хо- роший уровень гигиены рта. Диагноз: врожденная двусторонняя адентия латеральных резцов верхней челюсти.При курации пациентки использовали алгоритм обследования и лечения. На первом этапе курации было принято решение о проведении ор- тодонтической коррекции с помощью несъёмной эджуайс-техники. На втором этапе курации были установлены дентальные импланты в области зубов 1.2, 2.2, 4.5.При оценке состояния десны выявлено рыхлое прилегание в области дентального импланта 1.2 зуба, что потребовало проведения пародонтологи- ческого лечения.На третьем этапе курации пациентке были уста- новлены цифровые безметалловые ортопедические конструкции по технологии CAD/CAM.

Выводы. Наше исследование показало, что несмотря на отличающиеся показатели в состо- янии костной и мягких тканей, у пациентов обеих наблюдаемых групп установленные конструкции выполняли жевательную и эстетическую функции. Выявленные нами в процессе наблюдения за па- циентами изменения положения зубов и состояния мягких тканей, безусловно, потребовали коррекции; при этом не выявлено ни одного случая потери имплантата.Применение компьютерных программ по плани- рованию дентальной имплантации, навигационной хирургии дают возможность наиболее точно устано- вить дентальные имплантаты, изготовить цифровые безметалловые ортопедические конструкции по технологии CAD/CAM. Это позволяет снизить риск ос- ложнений и достичь эффективного функционального и эстетического состояния зубочелюстной системы у пациентов с первичной адентией. В алгоритме обсле- дования и лечения пациентов с врождённой адентией представлен пошаговый предсказуемый подход к пациентам. В настоящее время реабилитация па- циентов с врождённым отсутствием зубов является предсказуемым методом лечения с включением циф- ровых технологий в ортодонтическом, хирургическом, ортопедическом, терапевтическом лечении.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Wismeijer D, Casentini P, Gallucci GO, Chiapasco M. Loading protocols in implant dentistry: Edentulous patients: ITI Treatment Guide Series. Quintessence Publishing. 2016; 4: 248.
2. Персин Л.С., [и др.]. Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии: учебное пособие. — Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2021. — 160 с. [Persin LS. Ortodontiya; Sovremennyye metody diagnostiki anomaliy zubov, zubnykh ryadov i okklyuzii: uchebnoye posobiye [Orthodontics; Modern methods for diagnosing anomalies of teeth, dentition and occlusion: a textbook]. Moskva: GEOTAR–Media [Moscow: GEOTAR– Media]. 2021; 160 p.
3. edited by Jan Lindhe and Niklaus P. Orthodontics and periodontics: Part 17 – Clinical Periodontology and Implant Dentistry. USA: Wiley–Blackwell. 2021; 7 (1): 590–596.
4. Blanchet E, Buisson P, Marin N, Jenny R. Implant positioning for esthetic purposes: importance of guided surgery. Titane. 2009; special issue: 91–98.
5. Buser D, Chappuis V, Belser UC, Chen S. Implant placement post extraction in esthetic single tooth sites: when immediate, when early, when late? Periodontology 2000. 2017; 73 (1): 84–102. DOI: 10.1111/prd.12170
6. edited by Jan Lindhe and Niklaus P Lang. Peri–implant pathology; Part 7 — Clinical

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Periodontology and Implant Dentistry. USA: Wiley–Blackwell. 2021; 7 (1): 547–557.

7. Никитина Л.И., Архипова А.А., Громова А.С. Использо- вание цифровых технологий при лечении первичной адентии боковых резцов верхней челюсти: в сборнике научных статей VI Всероссийской научно–практической конференции с международным участием «Актуаль-ные вопросы стоматологии детского возраста». — Ка- зань: КГМУ, 2023. — С.225–230. [Nikitina LI, Arhipova AA, Gromova AS. Ispol'zovaniye tsifrovykh tekhnologiy pri lechenii pervichnoy adentii bokovykh reztsov verkhney chelyusti: v sbornike nauchnykh statey VI Vserossiyskoy nauchno–prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem «Aktual'nyye voprosy stomatologii detskogo vozrasta» [The use of digital technologies in the treatment of primary edentulism of the lateral incisors of the upper jaw: in the collection of scientific articles of the VI All–Russian Scientific and Practical Conference with international participation "Current issues in pediatricdentistry"]. Kazan': KGMU [Kazan: KSMU]. 2023; 225–230. (In Russ.)].

8. Рубникович С.П., Денисова Ю.Л., Трояновская М.С. Особенности комплексного стоматологического лечения пациентов с первичной адентией боковых резцов // Medicina stomatologică. — 2020. — № 1 (54). — С.83–97. [Rubnicovich SP, Denisova YL, Troyanovskaya MS. Osobennosti kompleksnogo stomatologicheskogo lechenija pacientov s pervichnoj adentiej bokovyh rezcov [Peculiarities of complex dental treatment of patients with primary adentia of lateral incisors]. Medicina stomatologica [Dental medicine]. 2020; 1 (54): 83–97. (In Russ.)].

9. Никитина Л.И., Гилязева В.В., Громова А.С. Немед- ленная установка имплантатов в лунку удаленного зуба и немедленное временное протезирование – как метод совершенствования стоматологической реа- билитации // Пульс. — 2022. — Т. 24, № 8. — С.20–25. [Nikitina LI, Gilyazeva VV, Gromova AS. Nemedlennaya ustanovka implantatov v lunku udalennogo zuba i nemedlennoe vremennoe protezirovanie — kak metod sovershenstvovaniya stomatologicheskoi reabilitacii [Immediate placement implants in the socket of the extracted tooth and immediate temporary prosthetics as a method for improving dental rehabilitation (review of literature data and own clinical experience)]. Pul's [Pulse]. 2022; 24 (8): 20–25. (In Russ.)]. DOI: 10.26787/ NYDHA–2686–6838–2022–24–8–20–25

10. Никитина Л.И., Мухамеджанова Л.Р., Егоров М.А., Гро- мова А.С. К вопросу об оценке состояния пародонта в области несъёмных конструкций с опорой на имплан- тах изготовленных по технологии CAD/CAM // Вестник современной клинической медицины. – 2022. – Т.15, вып.5. — С.52–57. [Nikitina LI, Mukchamedzhanova LR, Egorov MA, Gromova AS. K voprosu ob ocenke sostojanija
parodonta v oblasti nes'jomnyh konstrukcij s oporoj na implantah izgotovlennyh po tehnologii CAD/CAM [To the question about evaluation of the state of periodontal tissues in the area of fixed implant–supported prostheses made by CAD/CAM technology]. Vestnik sovremennoj klinicheskoj mediciny [The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine]. 2022; 15 (5): 52–57. (In Russ.)]. DOI: 10.20969/VSKM.2022.15(5).52–57

11. Никитина Л.И. Дентальная имплантация при первичной адентии: оценка состояния регионарного кровотока; статья в сборнике трудов конференции «Современная стоматология». — Казань: КГМУ, 2017. — С.312–323. [Nikitina LI. Dental'naya implantatsiya pri pervichnoy adentii: otsenka sostoyaniya regionarnogo krovotoka; stat'ya v sbornike trudov konferentsii «Sovremennaya stomatologiya» [Dental implantation for primary adentia: assessment of the state of regional blood flow; article in the collection of proceedings of the conference "Modern Dentistry"].

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Kazan': KGMU [Kazan: KSMU]. 2017; 312–
323. (In Russ.)].

12. Никитина Л.И., Гилязева В.В., Громова А.С. Реаби- литация пациентов с врождённым отсутствием зу- бов // Natural resources of the Earth and environmental protection. — 2023. — Т.4. №1. — С.63–68. [Nikitina LI,Gilyazeva VV, Gromova AS. Reabilitacija pacientov s vrozhdjonnym otsutstviem zubov [Rehabilitation of patients with congenital absence of tooth]. Natural resources of the Earth and environmental protection. 2023; 4 (1): 63–68. (In Russ.)