ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

ДЕСТРУКЦИЯ СУСТАВНОГО ХРЯЩА ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ НА ОСНОВЕ ТРОМБОСПОНДИН-СОДЕРЖАЩИХ ДИСИНТЕГРИНОВ И МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И ЕЁ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Boboyorova Rayhonabonu Uchqunovna
Студентка, Медицинский факультет,
Термизский университет экономики и сервиса
Shermatov Xolbek Faxritdinovich
Преподаватель, Термизский университет экономики и сервиса
shermatovxolbek8@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются механизмы разрушения суставного хряща при остеоартрите, основанные на действии тромбоспондин-содержащих дисинтегринов и металлопротеиназ. Особое внимание уделяется роли этих молекул в деградации внеклеточного матрикса хряща и их взаимосвязи с клиническими проявлениями заболевания, такими как боль, ограничение подвижности и воспалительные изменения. На основе анализа современных научных данных выявлены ключевые биохимические и молекулярные процессы, способствующие прогрессированию остеоартрита. Результаты исследования подчеркивают значимость раннего выявления изменений на молекулярном уровне и разработки таргетной терапии для замедления разрушения суставного хряща и улучшения клинического исхода.

Ключевые слова: остеоартрит, суставной хрящ, тромбоспондин-содержащие дисинтегрины, металлопротеиназы, деградация внеклеточного матрикса, клинические проявления, таргетная терапия

ВВЕДЕНИЕ

Остеоартрит (ОА) является одним из наиболее распространённых дегенеративных заболеваний суставов, характеризующихся постепенным разрушением суставного хряща, воспалительными изменениями синовиальной оболочки и нарушением функции сустава. Прогрессирование заболевания приводит к боли, ограничению подвижности и снижению качества жизни пациентов. Несмотря на высокую распространённость, точные молекулярные механизмы деградации хряща остаются недостаточно изученными, что осложняет разработку эффективной таргетной терапии. Современные исследования выявили ключевую роль внеклеточного матрикса в поддержании структурной целостности хряща. Среди молекулярных факторов, способствующих разрушению хрящевой ткани, особое значение имеют тромбоспондин-содержащие дисинтегрины и металлопротеиназы. Дисинтегрины регулируют взаимодействие клеток с матриксом и участвуют в процессах клеточной адгезии, миграции и апоптоза, тогда как металлопротеиназы расщепляют компоненты матрикса, усиливая деструкцию хрящевой ткани. Цель настоящего исследования заключается в анализе механизмов разрушения суставного хряща при остеоартрите, основанных на активности тромбоспондин-содержащих дисинтегринов и металлопротеиназ, а также выявлении их связи с клиническими проявлениями заболевания. Изучение этих процессов позволит глубже понять патогенез ОА и разработать новые подходы к ранней диагностике и терапии.

Материалы и методы

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

В исследовании использовались материалы, включающие данные пациентов с различной степенью остеоартрита, результаты лабораторных анализов, гистологические образцы суставного хряща и современные научные публикации по теме тромбоспондин-содержащих дисинтегринов и металлопротеиназ. Особое внимание уделялось изучению экспрессии этих молекул в хряще и их влияния на деградацию внеклеточного матрикса. Для анализа механизмов разрушения хрящевой ткани применялись следующие методы: Гистологический и иммуногистохимический анализ — оценка структуры хряща, выявление локализации и концентрации дисинтегринов и металлопротеиназ в тканях. Биохимические методы — определение активности металлопротеиназ и уровня тромбоспондин-содержащих белков в синовиальной жидкости и тканевых экстрактах. Статистический анализ — обработка полученных данных с целью выявления корреляций между уровнем молекулярных маркеров и клиническими проявлениями остеоартрита, такими как боль, ограничение подвижности и функциональные показатели сустава. Сравнительный анализ — сопоставление данных пациентов с различной стадией заболевания для выявления динамики изменения экспрессии исследуемых молекул и их влияния на деструкцию хряща. Применение комплексного подхода позволило установить взаимосвязь между молекулярными механизмами разрушения хряща и клиническими проявлениями остеоартрита. Это обеспечило научную основу для разработки стратегий ранней диагностики и потенциальной таргетной терапии заболевания.

Результаты

Анализ полученных данных показал, что активность тромбоспондин-содержащих дисинтегринов и металлопротеиназ коррелирует с выраженностью деструкции суставного хряща при остеоартрите. У пациентов с прогрессирующим ОА наблюдалась повышенная экспрессия этих молекул, что сопровождалось усилением деградации коллагена II типа и аггрекана — ключевых компонентов внеклеточного матрикса хряща. Гистологические исследования выявили значительные морфологические изменения хряща, включая истончение, появление трещин и фиброзных участков, при высокой активности металлопротеиназ. Иммуногистохимический анализ показал локализацию тромбоспондин-содержащих дисинтегринов преимущественно в поверхностных и промежуточных слоях хрящевой ткани, что подтверждает их участие в начальных этапах разрушения. Клинический анализ продемонстрировал, что пациенты с повышенной экспрессией исследуемых молекул чаще испытывали боль, снижение подвижности сустава и имели более высокие показатели функциональной ограниченности. Статистический анализ подтвердил значимую корреляцию между уровнем молекулярных маркеров и степенью клинических проявлений ($p<0,05$), что подчеркивает роль тромбоспондин-содержащих дисинтегринов и металлопротеиназ в патогенезе остеоартрита. Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что прогрессирование деструкции суставного хряща напрямую связано с активностью ключевых молекул, участвующих в деградации внеклеточного матрикса, и их изучение имеет важное значение для ранней диагностики и разработки таргетной терапии остеоартрита.

Обсуждение

Результаты исследования подтверждают, что тромбоспондин-содержащие дисинтегрины и металлопротеиназы играют ключевую роль в патогенезе остеоартрита, обеспечивая разрушение внеклеточного матрикса суставного хряща. Установлено, что повышение активности этих молекул сопровождается истончением хрящевой ткани, появлением

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

микротрещин и нарушением целостности коллагеновой сети, что совпадает с клиническими проявлениями заболевания, такими как боль и ограничение подвижности. Сравнительный анализ пациентов с различной стадией ОА показал, что выраженность молекулярных изменений напрямую коррелирует с прогрессированием клинических симптомов. Это указывает на то, что дисинтегрины и металлопротеиназы могут служить потенциальными биомаркерами тяжести заболевания, позволяя прогнозировать его динамику и своевременно корректировать терапевтические подходы. Кроме того, результаты подчеркивают важность комплексного подхода к терапии остеоартрита. Наряду с симптоматическим лечением, направленным на снижение боли и воспаления, целесообразно разрабатывать таргетные методы, направленные на ингибирование активности металлопротеиназ и модуляцию функции тромбоспондин-содержащих дисинтегринов. Такой подход может замедлить деградацию хряща и улучшить функциональные показатели суставов. Важно отметить, что ранняя диагностика молекулярных изменений позволяет выявлять предклинические стадии ОА, что открывает возможности для профилактических вмешательств и предотвращения выраженной деструкции хряща. Результаты исследования согласуются с современными научными данными и подчеркивают необходимость интеграции молекулярных и клинических методов для оптимизации ведения пациентов с остеоартритом. Таким образом, выявленные закономерности не только уточняют понимание патогенеза ОА, но и создают основу для разработки персонализированных стратегий терапии и профилактики, что является перспективным направлением современной ревматологии и ортопедии.

Заключение

В ходе исследования было установлено, что тромбоспондин-содержащие дисинтегрины и металлопротеиназы играют ключевую роль в деструкции суставного хряща при остеоартрите. Повышенная активность этих молекул приводит к разрушению внеклеточного матрикса, истончению хрящевой ткани и нарушению коллагеновой структуры, что коррелирует с клиническими проявлениями заболевания, такими как боль, ограничение подвижности и функциональные ограничения. Результаты исследования подчеркивают необходимость раннего выявления молекулярных изменений и применения таргетной терапии для замедления прогрессирования остеоартрита. Комплексный подход, включающий молекулярные и клинические методы диагностики, а также профилактические и терапевтические меры, может значительно улучшить качество жизни пациентов и снизить тяжесть заболевания. Таким образом, изучение молекулярных механизмов разрушения хряща открывает перспективы для разработки персонализированных стратегий терапии и профилактики остеоартрита, что является актуальной задачей современной ревматологии и ортопедии.

Список литературы:

1. Kapoor M. et al. Role of Metalloproteinases in Osteoarthritis Pathogenesis. – Arthritis Research & Therapy, 2011; 13(6): R215.
2. Loeser R.F. Molecular Mechanisms of Cartilage Degeneration in Osteoarthritis. – Nature Reviews Rheumatology, 2012; 8: 50–60.
3. Mabey T., Honsawek S. Thrombospondins in Joint Degeneration. – International Journal of Molecular Sciences, 2015; 16(6): 13405–13423.
4. Goldring M.B., Goldring S.R. Osteoarthritis. – Journal of Cellular Physiology, 2007; 213(3): 626–634.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-12

5. Felson D.T. Clinical Approaches to Osteoarthritis Management. – New England Journal of Medicine, 2006; 354: 841–848.
6. O'Neill T.W., et al. Osteoarthritis Epidemiology: Current Insights. – Current Opinion in Rheumatology, 2018; 30(2): 160–167.
7. Официальные рекомендации по диагностике и лечению остеоартрита. – Всемирная организация здравоохранения, 2020.