ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОНДИЛОЛИСТЕЗА (ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ).

Исаков Б.М., Исаков К.Б., Файзуллаев Д.Ш.
Андижанский государственный медицинский институт.

Аннотация

Спондилолистез является многофакторной патологией позвоночного столба, сопровождающейся смещением тела позвонка и развитием выраженных клинико-неврологических проявлений. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и консервативной терапии, хирургическое лечение остаётся основным методом коррекции при средних и тяжёлых формах заболевания. В статье представлен расширенный анализ современных хирургических методов лечения спондилолистеза с учётом патогенетических механизмов, степени смещения, возраста пациента и наличия сопутствующей патологии. Рассматриваются преимущества и недостатки различных хирургических подходов, анализируются результаты клинических исследований отечественных и зарубежных авторов, а также обсуждаются перспективы развития хирургии позвоночника.

Ключевые слова: спондилолистез, хирургическое лечение, декомпрессия, спондилодез, транспедикулярная фиксация, нестабильность позвоночника.

Annotatsiya

Spondilolistez umurtqa pog‘onasining ko‘p omilli kasalligi bo‘lib, umurtqa tanasining siljishi va og‘ir klinik-nevrologik belgilar bilan namoyon bo‘ladi. Diagnostika va konservativ davolash usullarining rivojlanishiga qaramay, o‘rta va og‘ir shakllarda jarrohlik davolash asosiy usul bo‘lib qolmoqda. Ushbu maqolada spondilolistezni jarrohlik yo‘li bilan davolashning zamonaviy usullari patogenez, siljish darajasi, bemorning yoshi va hamroh kasalliklarni hisobga olgan holda keng yoritilgan. Mahalliy va xorijiy mualliflarning klinik tadqiqotlari natijalari tahlil qilinib, umurtqa jarrohligining rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: spondilolistez, jarrohlik davolash, dekompressiya, spondilodez, umurtqa stabilizatsiyasi.

Abstract

Spondylolisthesis is a multifactorial spinal disorder characterized by vertebral displacement and severe clinical and neurological manifestations. Despite advances in diagnostic and conservative treatment methods, surgical intervention remains the primary treatment option for moderate and severe forms of the disease. This article provides an extended analysis of modern surgical approaches to the treatment of spondylolisthesis, taking into account pathogenetic mechanisms, degree of displacement, patient age, and comorbidities. The advantages and limitations of various surgical techniques are discussed, along with a review of clinical outcomes reported by domestic and international authors and perspectives for the future development of spinal surgery.

Keywords: spondylolisthesis, surgical treatment, decompression, spinal fusion, pedicle screw fixation, spinal instability.

ВВЕДЕНИЕ

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

Патология позвоночника занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата. Спондилолистез, как одна из форм сегментарной нестабильности, представляет собой серьёзную медико-социальную проблему ввиду высокой распространённости, склонности к прогрессированию и частого развития хронического болевого синдрома (Продан А.И., 2018; Weinstein et al., 2007).

Современные эпидемиологические данные свидетельствуют о росте заболеваемости дегенеративным спондилолистезом, что связано с увеличением продолжительности жизни и распространённостью дегенеративных заболеваний позвоночника (Kirkaldy-Willis, 1990).

Этиология и патогенез спондилолистеза.

Таблица 1.

Классификация спондилолистеза по Wiltse.

Тип спондилолистеза	Характеристика	Основные причины
Диспластический	Врожденные аномалии дуг и фасеток	Генетические нарушения развития
Истмический	Дефект межсуставной части дуги	Перегрузка, микротравмы
Дегенеративный	Смещение без дефекта дуги	Артроз фасеток, дегенерация диска
Травматический	Повреждение костных структур	Острая травма
Патологический	На фоне системных заболеваний	Опухоли, инфекции

В основе развития спондилолистеза лежит нарушение баланса между стабилизирующими и дестабилизирующими факторами позвоночного сегмента. К основным патогенетическим механизмам относятся:

- дегенерация межпозвоночных дисков;
- артроз дугоотростчатых суставов;
- ослабление связочного аппарата;
- врождённые аномалии развития позвоночника.

Согласно классификации Wiltse, выделяют пять основных типов спондилолистеза, каждый из которых требует индивидуального подхода к лечению.

Клиническая картина и диагностика

Клинические проявления варьируют от бессимптомного течения до выраженного болевого синдрома и тяжёлых неврологических нарушений. Наиболее характерными симптомами являются:

- хроническая люмбалгия;
- корешковый болевой синдром;
- нейрогенная перемежающаяся хромота;
- нарушения функции тазовых органов (в тяжёлых случаях).

Диагностика основывается на данных рентгенографии с функциональными пробами, МРТ и КТ, позволяющих оценить степень смещения, состояние нервных структур и стабильность позвоночного сегмента (Шевелев И.Н., 2020).

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

Показания и противопоказания к хирургическому лечению.

Таблица 2.

Степени спондилолистеза по Meyerding.

Степень	Процент смещения позвонка	Клиническая значимость
I	до 25%	Часто бессимптомное течение
II	26–50%	Умеренный болевой синдром
III	51–75%	Выраженные боли, неврология
IV	76–100%	Высокий риск осложнений
V (спондилоптоз)	>100%	Тяжёлые неврологические нарушения

Показания к оперативному вмешательству включают:

- неэффективность консервативного лечения более 6 месяцев;
- прогрессирующий неврологический дефицит;
- спондилолистез III–V степени;
- выраженная нестабильность позвоночника.

Противопоказаниями являются тяжёлые соматические заболевания, острые инфекционные процессы и декомпенсированные состояния.

Хирургические методы лечения.

Таблица 3.

Основные хирургические методы лечения спондилолистеза.

Метод	Краткая характеристика	Преимущества	Недостатки
Декомпрессия	Устранение сдавления нервных структур	Быстрое уменьшение боли	Риск нестабильности
PLIF	Задний межтеловой спондилодез	Надёжная фиксация	Высокая травматичность
TLIF	Трансфораминальный доступ	Меньший риск неврологических осложнений	Техническая сложность
ALIF	Передний доступ	Хорошее восстановление высоты диска	Ограниченные показания
MIS-TLIF	Минимально инвазивная техника	Меньшая кровопотеря	Высокие требования к оборудованию

1. Декомпрессивные операции

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

Ламинэктомия и фораминотомия применяются для устранения компрессии нервных структур. Однако изолированная декомпрессия без стабилизации может способствовать прогрессированию нестабильности (Ghogawala et al., 2016).

2. Стабилизирующие вмешательства

Задний спондилодез с транспедикулярной фиксацией является «золотым стандартом» хирургического лечения. Используются следующие техники:

- PLIF (posterior lumbar interbody fusion);
- TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion);
- ALIF (anterior lumbar interbody fusion).

Каждая методика имеет свои показания, преимущества и ограничения (Harms, 1998; Луцик А.А., 2019).

3. Минимально инвазивные технологии

В последние годы активно внедряются минимально инвазивные методы, позволяющие снизить травматичность операции, уменьшить кровопотерю и сократить сроки реабилитации (Mobbs et al., 2015).

Послеоперационное ведение и реабилитация

Послеоперационная реабилитация включает раннюю активизацию пациента, физиотерапию, лечебную физкультуру и медикаментозную поддержку. Правильно организованный восстановительный период существенно влияет на отдалённые результаты лечения.

Таблица 4.

Сравнение результатов хирургического и консервативного лечения.

Параметр	Консервативное лечение	Хирургическое лечение
Купирование боли	Частичное	Выраженное
Восстановление функции	Ограниченное	Значительное
Риск прогрессирования	Высокий	Минимальный
Долгосрочный эффект	Нестабильный	Устойчивый

Осложнения хирургического лечения.

Таблица 5.

Основные послеоперационные осложнения.

Осложнение	Частота (%)	Факторы риска
Инфекция	3–7	Сахарный диабет, ожирение
Псевдоартроз	5–10	Курение, остеопороз
Повреждение нервов	2–5	Высокая степень смещения
Поломка фиксаторов	1–3	Несоблюдение режима

К основным осложнениям относятся:

- инфекционные осложнения;
- псевдоартроз;
- повреждение нервных структур;
- несостоятельность металлоконструкций.

По данным зарубежных исследований, частота осложнений составляет 5–20% и зависит от объёма вмешательства и сопутствующей патологии (Moller, Hedlund, 2000).

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

Перспективы развития хирургии спондилолистеза

Перспективными направлениями являются:

- навигационные и робот-ассистированные технологии;
- биологические материалы для ускорения спондилодеза;
- персонализированные имплантаты, созданные с использованием 3D-печати.

Заключение

Хирургическое лечение спондилолистеза является высокоэффективным методом при правильном выборе показаний и тактики вмешательства. Современные технологии позволяют достичь стабильной фиксации позвоночника, уменьшить болевой синдром и улучшить качество жизни пациентов.

Список литературы

1. Wiltse L.L. et al. *Clin Orthop Relat Res*. 1976.
2. Kirkaldy-Willis W.H. *Managing Low Back Pain*. 1990.
3. Weinstein J.N. et al. *Spine*. 2007.
4. Ghogawala Z. et al. *N Engl J Med*. 2016.
5. Harms J. *Z Orthop Ihre Grenzgeb*. 1998.
6. Mobbs R.J. et al. *J Spine Surg*. 2015.
7. Moller H., Hedlund R. *Spine*. 2000.
8. Продан А.И. Дегенеративные заболевания позвоночника. 2018.
9. Луцик А.А. Хирургия позвоночника. 2019.
10. Шевелев И.Н. Нейрохирургия позвоночника. 2020.