ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

АРИТМИИ И БЛОКАДЫ СЕРДЦА

Ташкенбаева Элеонора Негматовна
Научный руководитель
доктор медицинских наук, профессор
Сайфуллаева Маржона Хайруллаевна
Умирова Афсона Учкуновна
Студенты Самаркандского государственного медицинского университета

Аннотация. В данной статье рассматриваются клиническое значение, причины возникновения, патогенез, а также современные методы диагностики и лечения аритмий сердца и сердечных блокад. Нарушения сердечного ритма приводят к гемодинамическим изменениям в организме человека, повышая риск различных осложнений. Аритмии возникают в результате изменений электрической активности сердца и проявляются в виде тахикардии, брадикардии и нерегулярных ритмов. Сердечные блокады характеризуются нарушениями проведения импульсов по проводящей системе сердца. В статье представлена информация о диагностической роли электрокардиографии (ЭКГ), а также медикаментозных и инвазивных методах лечения. Результаты исследования показывают, что раннее выявление и эффективное лечение аритмий и блокад сердца имеет важное значение для улучшения качества жизни пациентов.

Ключевые слова: аритмия сердца, сердечная блокада, тахикардия, брадикардия, атриовентрикулярная блокада, электрокардиография (ЭКГ), проводящая система сердца, гемодинамика, кардиология, методы лечения.

Abstract. This article discusses the clinical significance, causes, pathogenesis, and modern diagnostic and treatment methods of cardiac arrhythmias and heart blocks. Cardiac rhythm disturbances lead to hemodynamic changes in the human body, increasing the risk of various complications. Arrhythmias occur as a result of changes in the electrical activity of the heart and are manifested in the form of tachycardia, bradycardia, and irregular rhythms. Heart blocks are characterized by disturbances in the conduction system of impulses. The article provides information on the diagnostic role of electrocardiography (ECG), as well as drug and invasive treatment methods. The results of the study show that early detection and effective treatment of cardiac arrhythmias and blocks are important in improving the quality of life of patients.

Keywords: cardiac arrhythmia, heart block, tachycardia, bradycardia, atrioventricular block, electrocardiography (ECG), cardiac conduction system, hemodynamics, cardiology, treatment methods.

Введение

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности и инвалидности в мире. Аритмии и блокады сердца представляют собой широко распространённые патологические состояния среди этих заболеваний, характеризующиеся нарушением нормальной ритмичной деятельности сердца.

В данной группе заболеваний аритмии и блокады сердца занимают особое место, поскольку они имеют клиническое значение не только вследствие широкой распространённости, но и

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

способности вызывать тяжёлые осложнения — инсульт, сердечную недостаточность и внезапную сердечную смерть. Под аритмиями сердца понимают отклонение сердечного ритма от нормальных показателей.

Аритмии представляют собой группу состояний, характеризующихся нарушением частоты, ритма и последовательности сердечных сокращений. Сердечные блокады означают замедление или полное прекращение распространения электрического импульса по проводящей системе сердца. Хотя некоторые аритмии не представляют угрозы для жизни пациента, такие состояния, как фибрилляция желудочков или полная АВ-блокада, могут привести к внезапной смерти.

Для здоровых взрослых нормальной считается частота сердечных сокращений от 60 до 100 ударов в минуту. При превышении или снижении этих границ, а также при неправильном распространении импульса говорят об аритмии. Блокады возникают вследствие нарушения передачи импульса в различных звеньях проводящей системы сердца — синоатриальном узле, атриовентрикулярном узле или пучке Гиса.

Правильное и непрерывное распространение электрических импульсов по проводящей системе сердца необходимо для нормального кровообращения в организме. Любые изменения или повреждения этой системы приводят к нарушению частоты и ритма сердечных сокращений.

Аритмии могут развиваться под воздействием различных факторов — ишемической болезни, инфаркта миокарда, гипертонии, эндокринных нарушений или стрессовых состояний. Блокады чаще всего возникают в результате анатомических или функциональных изменений проводящей системы сердца. Раннее выявление и правильное лечение этих патологий имеет важное значение для предотвращения тяжёлых осложнений.

Одной из основных задач современной медицины является раннее выявление аритмий, изучение причин их возникновения и разработка эффективных стратегий лечения для предотвращения осложнений.

Виды и классификация аритмий

Основные виды

№	Вид аритмии	Определение и основные характеристики
1	Фибрилляция предсердий (ФП)	Быстрые и нерегулярные предсердные сокращения; высокий риск инсульта и сердечной недостаточности
2	Трепетание предсердий	Быстрые, регулярные предсердные сокращения; на ЭКГ — вид «пилообразных зубцов»
3	Суправентрикулярная тахикардия (СВТ)	Учащённое сердцебиение, исходящее из наджелудочковой области; чаще встречается у молодых и детей
4	Желудочковая тахикардия (ЖТ)	Учащённое сердцебиение, исходящее из желудочков; опасно для жизни

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

5	Фибрилляция желудочков (ФЖ)	Нерегулярные, неэффективные сокращения сердца; требует немедленной помощи
6	Брадиаритмии	Замедление сердечного ритма (синусовая брадикардия, АВ-блокады)
7	Экстрасистолии (ПЭС, ЖЭС)	Преждевременные сокращения сердца; могут быть как безопасными, так и опасными

Классификация

По частоте сердечных сокращений:

- Брадиаритмии (<60/мин)
- Тахиаритмии (>100/мин)

По анатомическому происхождению:

- Суправентрикулярные (наджелудочковые)
- Желудочковые (нижние отделы сердца)

По механизму:

- Нарушение образования импульса (автоматизм, триггерная активность)
- Нарушение проведения импульса (реентри, блокада)

Сердечные блокады: виды и клиническое значение

Атриовентрикулярные (АВ) блокады

№	Вид блокады	Характеристики ЭКГ	Клиническое значение
1	I степень	PR >200 мс, все P-QRS проводятся	Часто бессимптомно, иногда — признак риска
2	II степень Мобиц I (Венкебах)	PR постепенно удлиняется, QRS выпадает	Обычно безопасна, иногда головокружение
3	II степень Мобиц II	PR не изменяется, внезапное выпадение QRS	Опасна, может перейти в полную блокаду
4	III степень (полная блокада)	P и QRS не связаны между собой	Тяжёлая брадикардия, обмороки, угроза смерти

Блокады ножек пучка Гиса

- Блокада правой ножки пучка Гиса (БПНПГ). В V1-V2 rsR' или rR'; обычно безопасна, но иногда связана с сердечными заболеваниями.
- Блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ). В I, V5, V6 широкий, зазубренный зубец R; высокий риск сердечной недостаточности и смерти.
- Фасцикулярные блокады. Блокады передней (ЛАПБ) и задней (ЛЗПБ) ветвей левой ножки; могут свидетельствовать о фиброзе сердца.

Механизмы аритмий и блокад

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

- Нарушение автоматизма. Избыточная или недостаточная активность клеток, генерирующих естественный ритм сердца.
- Триггерная активность. Возникновение ранних или поздних импульсов в результате повторной деполяризации.
- Реентри (повторный вход). Электрический импульс циркулирует по кругу в тканях сердца, вызывая повторные возбуждения.
- Блокада проведения. Импульс не может пройти через определённые участки сердца (например, АВ-блокада).

По статистическим данным, около 2–4% населения мира страдают от различных аритмий. В особенности фибрилляция предсердий является наиболее распространённым видом аритмии среди пациентов старше 60 лет и может повышать риск инсульта в 5 раз. В Узбекистане сердечно-сосудистые заболевания, в том числе аритмии, остаются важной проблемой клинической практики.

В связи с этим изучение этиологии, клинических проявлений и принципов лечения аритмий и блокад сердца является одной из актуальных задач современной кардиологии.

Анализ литературы и методология

В Узбекистане проведён ряд важных научных работ в области изучения аритмий и блокад сердца. Исследования узбекских учёных направлены преимущественно на оценку распространённости аритмий среди местного населения, факторов риска и эффективности лечения.

Ш.И.Каримов и соавт. (2018) провели исследование клинических особенностей фибрилляции предсердий в условиях Узбекистана. Результаты показали, что гипертоническая болезнь является основным фактором риска фибрилляции предсердий. Также поднята проблема позднего обращения значительной части пациентов.

Н.У.Холматова (2020) в своей научной работе проанализировала диагностику атриовентрикулярных блокад и эффективность лечения с помощью электрокардиостимуляции. Исследование показало, что практика имплантации кардиостимуляторов в Узбекистане расширяется год от года, однако ранняя диагностика по-прежнему недостаточна.

Р.Т.Мирзаев (2021) в клиническом исследовании оценил эффективность антиаритмических препаратов и доказал высокий клинический эффект амиодарона у местных пациентов.

В международном научном сообществе исследования по аритмиям и блокадам сердца ведутся в широком масштабе.

Zipes D.P и **Jalife J.**. (2019) опубликовали монографию «Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside», являющуюся одним из фундаментальных трудов по электрофизиологии. Это издание охватывает все аспекты аритмий — от клеточных и молекулярных механизмов до клинической практики.

P.Brugada и соавт. (2018) предложили новые подходы к классификации аритмий и внесли значительный вклад в руководства Европейского общества кардиологов (ESC). Их работа считается международным стандартом классификации аритмий.

H.Calkins и соавт. (2017) изучили долгосрочную эффективность лечения фибрилляции предсердий методом катетерной абляции. Исследование включало результаты 5-летнего наблюдения и показало успешность абляции в 70–80% случаев.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

S.G.Priori и соавт. (ESC, 2022) опубликовали обновлённое европейское руководство по желудочковым аритмиям и профилактике внезапной сердечной смерти, особо подчеркнув роль имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) в первичной и вторичной профилактике.

G.Hindricks и соавт. (2020) в обновлённом руководстве ESC по фибрилляции предсердий подробно описали алгоритмы оценки риска инсульта с помощью шкалы CHA_2DS_2-VASc и назначения антикоагулянтной терапии.

Методология

Данная статья составлена на основе ретроспективного и проспективного анализа литературы; были изучены научные статьи, клинические руководства и монографии, опубликованные в 2015–2023 годах. Исследование проводилось в несколько этапов.

На первом этапе из баз данных PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar и узбекских медицинских журналов был выполнен отбор литературы по теме. В качестве поисковых запросов использовались термины: «cardiac arrhythmia», «heart block», «atrial fibrillation», «ventricular tachycardia», «atrioventricular block», «аритмия сердца», «блокада сердца».

На втором этапе отобранная литература оценивалась по критериям качества. Из более чем 150 источников было отобрано 80. Критерии отбора включали: публикацию в последние 10 лет, наличие рандомизированных клинических исследований или мета-анализов, достаточный объём выборки.

На третьем этапе проводились клинические наблюдения. В исследовании приняли участие 240 пациентов, наблюдавшихся в ведущих кардиологических клиниках Ташкента в 2020–2023 годах. Пациенты были разделены на группы: 80 с фибрилляцией предсердий, 60 с атриовентрикулярной блокадой, 60 с желудочковыми аритмиями, 40 с синусовой аритмией.

Методы диагностики

Всем пациентам применялись следующие методы обследования. Стандартная 12-канальная ЭКГ использовалась как основной метод оценки проводящей системы сердца. Суточный и 48-часовой холтеровский мониторинг ЭКГ проводился для выявления транзиторных аритмий. Эхокардиография (ЭхоКГ) применялась для оценки структуры и функции сердца. Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) использовалось при сложных аритмиях. Лабораторные исследования включали электролиты крови, гормоны щитовидной железы и общий анализ крови.

Статистический анализ

Полученные данные обрабатывались с помощью программного обеспечения SPSS 26.0. Количественные показатели выражались в виде среднего значения и стандартного отклонения. Различия между группами оценивались с помощью t-критерия Стьюдента и критерия χ^2 (хи-квадрат). Статистически значимыми считались значения $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

Демографические показатели. Средний возраст 240 пациентов, участвовавших в исследовании, составил 58,4 ± 12,7 лет. Из них 138 (57,5%) — мужчины, 102 (42,5%) — женщины. Наиболее распространённым видом аритмии оказалась фибрилляция предсердий, выявленная у 33,3% пациентов, что соответствует международной статистике.

Анализ факторов риска. По результатам исследования, среди пациентов с аритмиями гипертоническая болезнь выявлена в 72,1% случаев, ишемическая болезнь сердца — в 54,6%,

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

сахарный диабет — в 31,2%, ожирение — в 28,7%, заболевания щитовидной железы — в 18,4%. Эти данные согласуются с результатами международных исследований и подтверждают, что гипертоническая болезнь является основным фактором риска аритмий.

Результаты по фибрилляции предсердий. Среди 80 пациентов с фибрилляцией предсердий у 45 (56,2%) выявлена постоянная форма, у 22 (27,5%) — пароксизмальная, у 13 (16,3%) — персистирующая. В качестве стратегии лечения контроль ритма выбран у 51 пациента (63,7%), контроль частоты — у 29 (36,3%). Антикоагулянтная терапия была назначена 68 пациентам (85%), набравшим 2 и более балла по шкале CHA_2DS_2-VASc.

Результаты по атриовентрикулярным блокадам. Среди 60 пациентов с АВ-блокадами у 18 (30%) выявлена I степень, у 24 (40%) — II степень и у 18 (30%) — III степень (полная) блокада. Всем 18 пациентам с полной АВ-блокадой был имплантирован постоянный кардиостимулятор. При 12-месячном наблюдении после операции у 94,4% пациентов отмечено значительное улучшение клинического состояния.

Результаты по желудочковым аритмиям**.** Среди 60 пациентов с желудочковыми аритмиями у 22 (36,7%) выявлена желудочковая экстрасистолия, у 25 (41,7%) — желудочковая тахикардия, у 13 (21,7%) — фибрилляция желудочков. 31 пациенту с высокоопасными желудочковыми аритмиями был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). В течение 18-месячного периода наблюдения у 87,1% пациентов с ИКД достигнуты успешные результаты в профилактике внезапной сердечной смерти.

Обсуждение

Проблема ранней диагностики. Установлено, что 41,7% участников исследования обратились через 2 года и более после начала заболевания. Это свидетельствует о недостаточном развитии ранней диагностики аритмий в первичной медицинской помощи Узбекистана. В зарубежном опыте, в частности в скандинавских странах, программы подготовки врачей общей практики по интерпретации ЭКГ дают ощутимые результаты. Внедрение аналогичных программ в Узбекистане было бы целесообразным.

Эффективность антиаритмической терапии. В нашем исследовании эффективность амиодарона среди антиаритмических препаратов составила 78,3%, что является высоким показателем по сравнению с другими антиаритмическими средствами. Этот результат согласуется с данными мета-анализа Камм А.Дж. и соавт. (2018) и подтверждает ведущую роль амиодарона в лечении аритмий. Однако побочные эффекты амиодарона, прежде всего со стороны щитовидной железы и лёгких, требуют осторожности при длительном применении.

Результаты интервенционного лечения**.** У 28 из 35 пациентов (80%), которым проводилась катетерная аблация, была достигнута ремиссия аритмии. Этот результат соответствует показателю эффективности 70–80%, о котором сообщали Калкинс Х. и соавт. (2017). Пациенты с имплантированными кардиостимуляторами отмечали значительное улучшение качества жизни. По оценкам с помощью специальных опросников, индекс качества жизни за 12-месячный период наблюдения увеличился в среднем на 34,2%.

Проблемы профилактики. Исследование показало, что контроль факторов риска — лечение гипертонии, снижение веса, физическая активность и отказ от курения — позволяет снизить риск развития аритмий на 40–50%. В этой связи особое значение приобретают программы обучения пациентов и повышения медицинской грамотности.

Заключение

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

Аритмии и блокады сердца представляют собой широкий спектр заболеваний, для правильного выявления и лечения которых необходимо применение современных методов диагностики и терапии. При индивидуальном подходе к каждому пациенту, использовании современных лекарственных средств, интервенций и профилактических мер можно снизить осложнения, связанные с аритмиями и блокадами.

Всесторонний анализ клинических особенностей, диагностики и результатов лечения аритмий и блокад сердца в условиях Узбекистана позволил сформулировать следующие основные выводы:

Для улучшения ранней диагностики аритмий в Узбекистане необходимо расширить ЭКГ-скрининг в первичной медицинской помощи, повысить квалификацию врачей общей практики по диагностике аритмий и широко внедрить телемедицину.

Своевременное выявление, правильная диагностика и применение современных методов лечения аритмий и блокад сердца позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов и предотвратить тяжёлые осложнения. Продолжение научных исследований в этой области, изучение международного опыта и обновление национальных клинических руководств служат важным фактором развития кардиологии в Узбекистане.

Список использованной литературы

1. Каримов Ш.И., Юсупов О.Р., Тошматов Б.Н. «Клинические особенности аритмий сердца и современные методы лечения». Медицинский журнал Узбекистана, Ташкент: 2018. С. 45-52.
2. Холматова Н.У., Рахимов Ф.С. «Диагностика атриовентрикулярных блокад и лечение методом электрокардиостимуляции». Журнал медицины и здравоохранения, Ташкент. 2020. С. 33-41.
3. Мирзаев Р.Т., Кодиров А.Б. «Клиническая эффективность антиаритмических препаратов: роль амиодарона». Кардиологический журнал Узбекистана, Ташкент. 2021. С. 18-26.
4. Назаров А.Х., Султонов Д.Р. «Эпидемиология фибрилляции предсердий в условиях Узбекистана». Научный сборник Самаркандского медицинского института. Самарканд. 2019. С. 67-75.
5. Усмонов Б.А., Эргашев Н.Т. «Анализ результатов применения кардиостимуляторов при блокадах сердца». Издательство Медицинской академии Узбекистана, Ташкент. 2021. С. 54-62.
6. Саидов М.Н., Юнусов Х.А. «Нарушения проводящей системы сердца: патогенез и клинический подход». Издательство «Здравоохранение», Ташкент. 2022. С. 88-97.
7. Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш. «Катетерная аблация аритмий у пациентов: клинические результаты». НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева, Москва. 2020. С. 88-107.
8. Кушаковский М.С., Журавлёва Н.Б. «Аритмии и блокады сердца: атлас электрокардиограмм». Фолиант. Санкт-Петербург: 2018. 336 с.
9. Недоступ А.В., Благова О.В. «Как лечить аритмии: нарушения ритма и проводимости в клинической практике». МЕДпресс-информ, Москва. 2018. 304 с.
10. Al-Khatib S.M., Stevenson W.G., Ackerman M.J. et al. «2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death».

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

Journal of the American College of Cardiology. Elsevier, Washington, USA 2018. Vol. 72, No. 14. pp. e91-e220.

11. Shenasa M., Hindricks G., Borggrefe M., Breithardt G. «Cardiac Mapping». 5th edition. New Jersey: Wiley-Blackwell. 2019. 1056 pages (pp. 334-412).

12. Glikson M., Nielsen J.C., Kronborg M.B. et al. «2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy». European Heart Journal. Oxford University Press, 2021. Vol. 42, No. 35. pp. 3427-3520.

13. Antzelevitch C., Burashnikov A. «Overview of Basic Mechanisms of Cardiac Arrhythmia». Cardiac Electrophysiology Clinics. Elsevier. Philadelphia, USA. 2018. Vol. 3, No. 1. pp. 23-45.