ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

VALLIS FORMULASI VA UNING TATBIQLARI

Choriyeva Zebo Raxmonberdi qizi
Fizika-matematika fakulteti
Matematika ta'lim yo'nalishi 2-kurs
Ilmiy rahbar:**Bozorov Jo'rabek Tog'aymurodovich**
Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori .

Annotatsiya :

Mazkur maqolada Jon Vallis tomonidan kiritilgan mashhur formulalardan biri –Wallis formulasi va uning matematik analizdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Maxsus cheksiz ko'paytmalar orqali π sonining ifodalanishi va trigonometrik funksiyalar integrallarini hisoblashda bu formulani qo'llashning matematik asoslari keltiriladi.Maqolada cheksiz ko'paytmalar yordamida integral hisoblashning afzalliklari va uning matematik metodlardagi o'rni tahlil qilinadi.Maqola,shuningdek, integral va sonlar nazariyasidagi amaliy masalalarni hal qilishda Vallis formulasining foydaliyligini ko'rsatadi.Bu formula John Vallis tomonidan 1655-yilda kashf etilgan.

Kalit so'zlar: Vallis formulasining kelib chiqishi, Vallis formulasi va cheksiz ko'paytma shakli, misolllarga tadbiqi.

WALLIS FORMULA AND ITS APPLICATIONS

Choriyeva Zebo Rakhmonberdi daughter
Faculty of Physics and Mathematics
Mathematics 2nd year
Scientific supervisor: Bozorov Jo'rabek Togaymurodovich
Doctor of Philosophy in Physics and Mathematics.

Abstract: This article analyzes one of the famous formulas introduced by John Wallis - the Wallis formula and its importance in mathematical analysis. The mathematical foundations of the expression of the number π by special infinite products and the use of this formula in calculating the integrals of trigonometric functions are presented. The article analyzes the advantages of integral calculation using infinite products and its place in mathematical methods. The article also shows the usefulness of the Wallis formula in solving practical problems in integrals and number theory. This formula was discovered by John Wallis in 1655.

Keywords: Origin of the Wallis formula, Wallis formula and infinite product form, application to examples.

ФОРМУЛА ВАЛЛИСА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Дочь Чориевой Зебо Рахмонберди
Физико-математический факультет
Математическое образование 2-й год
Научный руководитель: Бозоров Джурабек Тогаймуродович
Доктор философии по физике и математике.

Абстрактный: В данной статье анализируется одна из знаменитых формул, введенных Джоном Уоллисом, — формула Уоллиса — и ее значение в математическом анализе. Представлены математические основы выражения числа π через специальные бесконечные произведения и использование этой формулы при вычислении интегралов тригонометрических функций. В статье анализируются преимущества интегрального

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

исчисления с использованием бесконечных произведений и его роль в математических методах. В статье также показана полезность формулы Уоллиса при решении практических задач по интегралам и теории чисел. Эта формула была открыта Джоном Уоллисом в 1655 году.

Ключевые слова: Происхождение формулы Уоллиса, формула Уоллиса и форма бесконечного произведения, применение к примерам.

Vallis formulasi π (pi) ning qiymatini cheksiz ko'paytma shaklida ifodalaydi. Formula quyidagicha yoziladi.

$$\frac{\pi}{2}=\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n}{2n-1}\cdot\frac{2n}{2n+1}\right)=\left(\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\right)\cdot\left(\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\right)\cdot\left(\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\right)\cdots$$

Vallis formulasini isbotlashning bir nechta usullari mavjud.

Vallis formulasini isbotlash uchun quydagi integralni ko'rib chiqamiz:

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx.$$

Bu integralni quyidagi rekurent munosabat orqali hisoblash mumkin.

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$$

Rekurent formulani isbotlash.

Bu formulani isbotlash uchun bo'laklab integrallash usulidan foydalanamiz.

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx$$

ni bo'laklab integrallaymiz va $u=\sin^{n-1}x$ va $dv=\sin x dx$ deb $du=(n-1)\sin^{n-2}x\cos x dx$ va $v=-\cos x$ bo'ladi.

Bo'laklab integrallash formulasi bo'yicha:

$$I_n=\left[-\sin^{n-1}x\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\cos^2 x dx$$

Birinchi had $x=0$ va $x=\frac{\pi}{2}$ da yo'qoladi, shuning uchun

$$I_n=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\left(1-\sin^2 x\right)dx$$

Bu ifodani quydagicha yozish mumkin:

$$I_n=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n$$

I_n ni topib rekurent formulani hosil qilamiz:

$$I_{2n}=\frac{(2k-1)(2k-3).....1}{2k(2k-2).....2}\cdot\frac{\pi}{2} \qquad (3)$$

Toq $n=2k+1$ uchun:

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-6

$$I_{2k+1}=\frac{2k(2k-2).....2}{(2k+1)(2k-1).....1} \qquad (4)$$

Juft va toq n lar uchun

$$\lim_{n\to\infty}\frac{I_{2k}}{I_{2k+1}}=1$$

I_n ni solishtirib, k $\to \infty$ da quydagi munosabatni hosil qilamiz.

Bu esa Vallis formulasiga olib keladi.
Aniq integralning ifodasidan ham Vallis formulasiga kelamiz.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^m xdx=\begin{cases}\frac{(m-1)!!}{m!!}\cdot\frac{\pi}{2}\\ \frac{(m-1)!!}{m!!}\end{cases} \qquad (*)$$

$0<x<\frac{\pi}{2}$ ekanligini hisobga olsak, quydagi tengsizlik o'rinli:

$$\sin^{2n+1}x<\sin^{2n}x<\sin^{2n-1}x$$

Bu tengsizlikni 0 dan $\frac{\pi}{2}$ gacha oraliqda integrallaymiz:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1}xdx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n-1}x$$

Bundan kelib chiqib, (*) formulaga ko'ra quydagini topamiz:

$$\frac{2n!!}{(2n+1)!!}<\frac{(2n-1)!!}{2n!!}\cdot\frac{\pi}{2}<\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

yoki

$$\left[\frac{2n!!}{(2n-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2n+1}<\frac{\pi}{2}<\left[\frac{2n!!}{(2n-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2n}$$

Ikkita chekka ifodaning farqi, ya'ni:

$$\left[\frac{2n!!}{(2n-1)!!}\right]^2\left[\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+1}\right]=\left[\frac{2n!!}{(2n-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2n(2n+1)}$$

$n\to\infty$ ga 0 ga intilishi aniq, $\frac{\pi}{2}$ da ularning umumiy limiti hisoblanadi.

Shunday qilib ,

$$\frac{\pi}{2}=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2n!!}{(2n+1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2n+1}$$

yoki

$$\frac{\pi}{2}=\lim_{x\to\infty}\frac{2\cdot2\cdot4\cdot4.....2n\cdot2n}{1\cdot3\cdot3\cdot5.....(2n-1)(2n+1)}$$

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Bu esa Vallis formulasidir.

1-misol

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$$

Qisman ko'paytma

$$P_n=(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})...(1-\frac{1}{n^2})=\frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n}\to\frac{1}{2},$$

Demak, cheksiz ko'paytma yaqinlashadi va uning qiymati $\frac{1}{2}$ ga teng bo'ladi.

Vallis formulasidan:

$$\frac{\pi}{2}=\lim_{n\to\infty}\frac{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdot...\cdot2n\cdot2n}{1\cdot3\cdot3\cdot5\cdot...\cdot(2n-1)(2n+1)},$$

$\frac{\pi}{2}$ sonini cheksiz ko'paytma shaklida yoyilmasi quydagicha:

$$\frac{\pi}{2}=\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot...=\prod_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{2n-1}\cdot\frac{2n}{2n+1}$$

Bu formula quydagilarga olib keladi:

$$\prod_{m=1}^{\infty}\left[1-\frac{1}{(2m-1)^2}\right]=\frac{\pi}{4},$$

$$\prod_{m=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{4m^2}\right)=\frac{2}{\pi},$$

Endi $|x|<1$ bo'lgan holni isbotlaymiz:

$$(1+x)\left(1+x^2\right)\left(1+x^4\right)\cdot...\cdot\left(1-x^{2n-1}\right)\cdot...=\frac{1}{1-x}.$$

Haqiqatan ham, bu tenglikni $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$ algebraik ayniyatni ketma-ket qo'llash orqali osongina tekshirish mumkin.

$$(1-x)\cdot P_n=(1-x)\left(1+x\right)\left(1+x^2\right)\cdot...\cdot\left(1+x^{2n-1}\right)=1-x^{2n}$$

Agar $|x|<1$ bo'lsa, $n\to\infty$ da $x^{2^n}\to0$ bo'lganligi sababli , chegara quyidagicha bo'ladi.

$$P_n=\frac{1-x^{2n}}{1-x}$$

Bizda quydagicha chegara mavjud edi:

$$\lim_{n\to\infty}\cos\frac{\varphi}{2}\cdot\cos\frac{\varphi}{4}\cdot\cos\frac{\varphi}{8}\cdot...\cdot\cos\frac{\varphi}{2^n}=\frac{\sin\varphi}{\varphi}\qquad(\varphi\neq0).$$

Buni quydagicha yozishimiz mumkin:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\varphi}{2^n}=\frac{\sin\varphi}{\varphi}.$$

Xususan, $\varphi=\frac{\pi}{2}$ bo'lsa, quydagi yoyilmaga ega bo'lamiz:

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-6

$$\frac{2}{\pi}=\cos\frac{\pi}{4}\cdot\cos\frac{\pi}{8}\cdot\ldots\cdot\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}\cdot\ldots\ .$$

Bizga ma'lumki,

$$\cos\frac{\varphi}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos\varphi}{2}}$$

va

$$\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}$$

U holda yoyilmani quydagicha yozish mumkin:

$$\frac{2}{\pi}=\sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\cdot\ldots$$

Bu formula VVallis formulasini cheksiz ko'paytuvchilar yordamida integrallarni o'rganishda qo'llangan birinchi formuladir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1) Г.М.Фичтенгольц. Курс дифференциального и интегралного исчисления том 2.
2) T.Azlarov X.Mansurov Matematik analiz 1-qism Toshkent ''O'qituvchi''1994-yil.
3) Б.П.Демитович Сборник задач и упреажнений по математичискомй анализу Маскуа "наука" 1990-год.
4) B.A.Shoimqulov.T.T.Tuychiyev.D.H.Djumaboyev.MATEMATIK ANALIZDAN MUSTAQIL ISHLAR.